

Diss. ⁴⁰
3847/11

4^o Dill. 3844 (11.

Program m

womit

Prorector und Senat

der Grossherzoglich Badischen

Albert-Ludwigs-Universität

zu Freiburg im Breisgau


zur

Eröffnung der Wintervorlesungen

auf den 2. November 1840

einladen.

Das Programm enthält: Die Versetzungen mit Wiederholungen zu bestimmten Summen aus einer oder mehreren beliebig beschränkten Elementen-Reihen nebst ihrer Anwendung auf Analysis und Wahrscheinlichkeits-Rechnung.



F r e i b u r g,

Universitäts-Buchdruckerei der GEBRÜDER GROOS.

1 8 4 0.

Die
Versetzungen mit Wiederholungen
zu bestimmten Summen

aus

einer oder mehreren beliebig beschränkten

E l e m e n t e n - R e i h e n

nebst ihrer Anwendung

auf

Analysis und Wahrscheinlichkeits-Rechnung

von

Dr. L. OETTINGER

ord. öff. Professor der Mathematik an der Universität Freiburg i. B.

F r e i b u r g,

Universitäts-Buchdruckerei der GEBRÜDER GROOS.

1 8 4 0.

Vorwort.

Die vorliegende Abhandlung über die Versetzungen mit Wiederholungen zu bestimmten Summen aus einer oder mehreren beliebig beschränkten Elementenreihen ist als ein Beitrag zur Combinations-Lehre zu betrachten. Die Stelle, welche diese Art von Combinationen im Gebäude der Mathematik einnimmt, wird sich aus dem Inhalte der Abhandlung und den darin gemachten Anwendungen ergeben. Die hierher gehörige Literatur ist am betreffenden Orte aufgeführt. Die Bezeichnungen, deren ich mich bedient habe sind dieselben, welche in meiner Combinations-Lehre vorkommen.

L. Oettinger.

Der Leser wird gebeten, folgende Unrichtigkeiten zu entfernen:

Seite	8	Zeile	1	von oben	1^{21}	statt	1^{21-1}
"	"	2	v. ob.	$(n-2k-1)^{q-1 1-1}$	st.	$(n-2k-1)^{q-1 1-1}$	
"	"	9	v. ob.	$1^{q-1 1}$	st.	$1^{q-1 1-1}$	
"	"	15	v. ob.	$-\frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3}$	st.	$+\frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3}$	
"	9	"	11	v. ob.	7)	st.	6)
"	16	"	11	v. u.	$1^{q-1 1}$	st.	$1^{q-1 1-1}$
"	24	"	8	v. ob.	gelöst	st.	gelöst.
"	31	"	10	v. ob.	$3h^2 \frac{(n+q-h-2r-3)^{2q-3 1-1}}{1^{2q-3 1}}$	st.	$3h^2 \frac{(n+q-h-r-3)^{2q-3 1-1}}{1^{2q-3 1}}$
"	32	"	1	v. ob.	$\sum_{m+1}^n A$	st.	$\sum_{m+1}^n A$
"	50	"	17	v. ob.	b_{r_2}	st.	a_{r_2}
"	50	"	18	v. ob.	c_{r_3}	st.	a_{r_3}
"	57	"	2	v. u.	Tafel	st.	Formel.
"	64	"	1	v. u.	10^{q-1}	st.	$10-1$.

§. 1.

Der einfachste Fall, welcher in der folgenden Untersuchung zur Frage kömmt und die Grundlage bildet, ist:

$$1) P'[sn; a_1, a_2, a_3 \dots a_r]^q$$

Es sollen nämlich unter $P'(sn; a_1, a_2, a_3 \dots a_r)^q$ **die Gruppen verstanden werden, welche entstehen, wenn die Versetzungen mit Wiederholungen zur Summe n in der q^{ten} Klasse aus den Elementen** $a_1, a_2, a_3, \dots a_r$ **gebildet werden; unter**

$$P'[sn; a_1, a_2, a_3 \dots a_r]^q$$

die Anzahl dieser Gruppen. Diese Zeichen sind die nämlichen, deren ich mich in meiner Combinationslehre bedient habe. Wird die Anzahl der Elemente, woraus die Gruppen der Versetzungen zu bestimmten Summen in irgend einer Klasse gebildet werden sollen, als vollständig angenommen, so ist bekanntlich

$$2) P'[sn; a_1, a_2, a_3 \dots a_r, a_{r+1} \dots a_{n-q+1}]^q = \frac{(n-1)^{q-1} - 1}{1^{q-1} - 1}$$

Um die unter 1 gestellte Aufgabe zu lösen, soll die Zahl der Elemente, woraus die Gruppen gebildet werden, vollständig angenommen werden; dann sollen diejenigen Gruppen, worin das Element mit der höchsten Stellenzahl ($a_n - q + 1$) erscheint; dann diejenigen, worin das Element mit der zweit-höchsten Stellenzahl ($a_n - q$); dann diejenigen, worin das Element mit der dritt-höchsten Stellenzahl erscheint, ausgeschlossen werden. Diefs wird bis zu dem Elemente a_{r+1} fortgeführt. Durch dieses Ausscheiden entstehen Versetzungen mit Wiederholungen in der $(q-1)^{ten}$ Classe zu den ergänzenden Summen aus lauter vollständigen Elementen-Reihen, und es ergibt sich für die auszuscheidenden Gruppen folgende Darstellung

$$a_{n-q+1} P'(s(q-1))^{q-1} + a_{n-q} P'(sq)^{q-1} + a_{n-q-1} P'(s(q+1))^{q-1} \\ + a_{n-q-2} P'(s(q+2))^{q-1} \dots + a_{r+1} P'(s(n-r-1))^{q-1}$$

In allen den Gruppen, welche hier angezeigt sind, nimmt das ausgeschiedene bezügliche Element die verschiedenen Stellungen ein, welche durch die Versetzungen geboten werden. Ihre Anzahl ist q . Die Anzahl der Gruppen, welche sich hieraus und aus 2 folgert, ist

$$3) \quad q \left[1 + \frac{2^{q-2|1}}{1^{q-2|1}} + \frac{3^{q-2|1}}{1^{q-2|1}} + \frac{4^{q-2|1}}{1^{q-2|1}} + \dots + \frac{(n-r-q+1)^{q-2|1}}{1^{q-2|1}} \right] \\ = q \cdot \frac{(n-r-q+1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} = q \cdot \frac{(n-r-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}}$$

Dieses Ausscheiden gibt so lange ein richtiges Resultat, als der Werth der Stellenzahl des ausgeschiedenen Elementes grösser ist, als die Werthe der Stellenzahlen derjenigen Elemente, die in den Gruppen vorkommen, welche durch die Bildung der Versetzungen mit Wiederholungen in der $(q-1)^{\text{ten}}$ Classe zu den verschiedenen Summen entstehen. Wird aber der Werth der Stellenzahlen der ausgeschiedenen Elemente so groß, oder kleiner, als der in den Gruppen vorkommenden, so ist das Ausscheiden zu oft, und bei ungleichen Stellenzahlen unter zwei Elementen geschehen. Dieser Fehler muß entfernt, und die hiedurch entstandenen Gruppen von der Anzahl der ausgeschiedenen selbst wieder ausgeschieden, oder dem Ganzen zugezählt werden. Hiernach wird nöthig, je zwei Elemente von den eingeführten

$$a_{r+1}, a_{r+2}, a_{r+3}, \dots, a_{n-q+1}$$

zugleich auszuschneiden und mit jedem Paare die Gruppen der Versetzungen mit Wiederholungen in der $(q-2)^{\text{ten}}$ Classe zu den ergänzenden Summen in Verbindung treten zu lassen. Hieraus ergibt sich folgende Darstellung

$$a_{r+1} a_{n-r-q+1} P'(s(q-2))^{q-2} + a_{r+2} a_{n-r-q} P'(s(q-2))^{q-2} + \dots + a_{n-r+q+1} a_{r+1} P'(s(q-2))^{q-2} \\ a_{r+1} a_{n-r-q} P'(s(q-1))^{q-2} + a_{r+2} a_{n-r-q-1} P'(s(q-1))^{q-2} \\ a_{r+1} a_{n-r-q-1} P'(sq)^{q-2} + a_{r+2} a_{n-r-q-2} P'(sq)^{q-2} \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{r+1} a_{r+1} P'(s(n-2r-2))^{q-2} + a_{r+2} a_{r+2} P'(s(n-2r-3))^{q-2} \\ (a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$$

Jedes Paar von den ausgeschiedenen Elementen nimmt mit den Gruppen, welche durch die Versetzungen mit Wiederholungen zu den ergänzenden Summen hervorgebracht werden, alle mögliche Stellungen ein. Dieß fällt mit den Zerstreuungen zweier Elemente in q Fächer zusammen. Die Anzahl dieser Zerstreuungen ist $\frac{q(q-1)}{1 \cdot 2}$, §. 41 Combinations-Lehre. Hieraus ergibt sich in Rücksicht auf 2 folgende Darstellung für die Anzahl der Gruppen.

$$4) \frac{q(q-1)}{1 \cdot 2} \left[1 + \frac{2^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} + \frac{3^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} + \frac{4^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} + \dots + \frac{(n-2r-q+1)^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} \right. \\ + 1 + \frac{2^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} + \frac{3^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} + \dots + \frac{(n-2r-q)^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} \\ + 1 + \frac{2^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} + \dots + \frac{(n-2r-q-1)^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} \\ \vdots \\ \left. \frac{1^{q-3|1}}{1^{q-3|1}} \right]$$

Vereinigt man diese Reihen in horizontaler oder vertikaler Richtung, so gehen sie in folgende über:

$$\frac{q(q-1)}{1 \cdot 2} \left[1 + \frac{2^{q-2|1}}{1^{q-2|1}} + \frac{3^{q-2|1}}{1^{q-2|1}} + \frac{4^{q-2|1}}{1^{q-2|1}} + \dots + \frac{(n-2r-q+1)^{q-2|1}}{1^{q-2|1}} \right] = \\ = \frac{q(q-1)}{1 \cdot 2} \frac{(n-2r-q+1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} = \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \cdot \frac{(n-2r-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}}$$

Diese Schlüsse sind so lange richtig, bis die, oben über den Werth der Stellenzahlen der ausgeschiedenen Elemente gemachte, Bemerkung eintritt. Geschieht dieß, so muß zu dem Ausscheiden eines dritten Elementes geschritten werden. Es ergibt sich folgende Darstellung

$$a_{r+1} a_{r+1} a_{n-2r-q+1} P'(s(q-3))^{q-3} + a_{r+1} a_{r+2} a_{n-2r-q} P'(s(q-3))^{q-3} \dots a_{r+1} a_{n-2r-q+1} a_{r+1} P'(s(q-3))^{q-3} \\ a_{r+1} a_{r+1} a_{n-2r-q} P'(s(q-2))^{q-3} + a_{r+1} a_{r+2} a_{n-2r-q-1} P'(s(q-2))^{q-3} \\ a_{r+1} a_{r+1} a_{n-2r-q-1} P'(s(q-1))^{q-3} + a_{r+1} a_{r+2} a_{n-2r-q-2} P'(s(q-1))^{q-3} \\ \vdots \\ a_{r+1} a_{r+1} a_{r+1} P'(s(n-3r-3))^{q-3} + a_{r+1} a_{r+2} a_{r+1} P'(s(n-3r-4))^{q-3}$$

$$\begin{aligned}
 & + a_{r+2} a_{r+1} a_{n-2r-q} P'(s(q-3))^{q-3} + a_{r+2} a_{r+2} a_{n-2r-q-1} P'(s(q-3))^{q-3} \dots a_{r+2} a_{n-r-q} a_{r+1} P'(s(q-3))^{q-3} \\
 & a_{r+2} a_{r+1} a_{n-2r-q-1} P'(s(q-2))^{q-3} + a_{r+2} a_{r+2} a_{n-2r-q-2} P'(s(q-2))^{q-3} \\
 & \vdots \\
 & a_{r+2} a_{r+1} a_{r+1} P'(s(n-3r-4))^{q-3} + a_{r+2} a_{r+2} a_{r+1} P'(s(n-3r-5))^{q-3} \\
 & \vdots \\
 & a_{n-2r-q+1} a_{r+1} a_{r+1} P'((q-3))^{q-3} \\
 & (a_1, \quad a_2, \quad a_3, \quad a_4, \quad \dots)
 \end{aligned}$$

Jede Gruppe, welche bei Bildung der Versetzungen mit Wiederholungen zu den ergänzenden Summen in der $(q-3)^{\text{ten}}$ Classe entsteht, tritt mit den zugehörigen ausgeschiedenen Elementen in alle mögliche Stellungen zusammen. Diese stimmen mit den Zerstreuungen dreier Elemente in q Fächer überein. Die Anzahl, die sich hieraus ergibt, ist $\frac{q(q-1)(q-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$. Diese Bemerkungen führen in Rücksicht auf die vorstehende Darstellung und auf Nro. 2 zu folgender Gruppenanzahl

$$\begin{aligned}
 5) \quad & \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} \left[1 + \left(\frac{2}{1}\right)^{q-4|1} + \left(\frac{3}{1}\right)^{q-4|1} + \left(\frac{4}{1}\right)^{q-4|1} + \dots + \left(\frac{n-3r-q+1}{1}\right)^{q-4|1} \right. \\
 & + 1 + \left(\frac{2}{1}\right)^{q-4|1} + \left(\frac{3}{1}\right)^{q-4|1} \dots + \left(\frac{n-3r-q}{1}\right)^{q-4|1} \\
 & + 1 + \left(\frac{2}{1}\right)^{q-4|1} \dots + \left(\frac{n-3r-q-1}{1}\right)^{q-4|1} \\
 & + 1 \dots + \left(\frac{n-3r-q-2}{1}\right)^{q-4|1} \\
 & \vdots \\
 & + 1 + \left(\frac{2}{1}\right)^{q-4|1} + \left(\frac{3}{1}\right)^{q-4|1} \dots + \left(\frac{n-3r-q}{1}\right)^{q-4|1} \\
 & + 1 + \left(\frac{2}{1}\right)^{q-4|1} \dots + \left(\frac{n-3r-q-1}{1}\right)^{q-4|1} \\
 & + 1 \dots + \left(\frac{n-3r-q-2}{1}\right)^{q-4|1} \\
 & \vdots \\
 & + 1 \\
 & \left. \right] .
 \end{aligned}$$

Werden diese Reihen, wie unter 4, zusammengezogen, so entsteht

$$\frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} \left[1 + \left(\frac{2}{1} \right)^{q-2|1} + \left(\frac{3}{1} \right)^{q-2|1} + \left(\frac{4}{1} \right)^{q-2|1} + \dots + \left(\frac{n-3r-q+1}{1} \right)^{q-2|1} \right]$$

$$= \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} \left(\frac{n-3r-q+1}{1} \right)^{q-1|1} = \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} \frac{(n-3r-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}}$$

Diese Schlüsse setzen sich leicht weiter fort. Hiernach bestimmt sich die Gruppen-Anzahl der Versetzungen mit Wiederholungen in der q^{ten} Classe zur Summe n , wenn nur die Elemente $a_1, a_2, a_3, \dots, a_r$ statt aller zur Bildung der Summe mitwirken, durch folgende Gleichung:

$$6) P' [sn; a_1, a_2, \dots, a_r]^q = \frac{(n-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} - q \cdot \frac{(n-r-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \frac{(n-2r-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} - \dots$$

$$= \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} \cdot \left(\frac{n-xr-1}{1^{q-1|1}} \right)^{q-1|1}$$

Die Gleichung bricht ab, wenn ein Glied in 0 übergehen, oder negativ werden sollte. Diese Gleichung ist bekannt, und nach Lacroix (Lehrbuch der Wahrscheinlichkeits-Rechnung §. 53) von Moivre (Miscellanea analytica p. 196.) durch das Polynomium entwickelt worden. Laplace hat sie in Théorie analytique des probabilités Nro. 13 entwickelt. In meiner Lehre von den Combinationen findet sie sich §. 20 angegeben. Hier erscheint sie aus der Natur der Combinationen jedoch auf eine etwas andere Weise, als dort, abgeleitet.

Zieht man die eben gefundene Gleichung von 2 ab, so ergibt sich die Gruppen-Anzahl der Versetzungen mit Wiederholungen in der q^{ten} Classe zur Summe n , worin die Elemente $a_{r+1}, a_{r+2}, a_{r+3}, \dots, a_{n-q+1}$ ein oder auch mehreremal vorkommen. Diefs soll durch folgende Darstellung angedeutet werden

$$7) P' [sn; a_1, a_2, a_3, \dots, a_r, 0]^q$$

$$= \frac{(n-r-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} - \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \frac{(n-2r-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} + \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} \frac{(n-3r-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} - \dots$$

Durch die in diesem §. angedeutete Methode ergibt sich die Aufsuchung anderer Sätze leicht, denn hierin liegt die Vorbereitung und Möglichkeit für die nachfolgenden Entwicklungen.

§. 2.

Wir wenden uns zu der Auflösung folgenden Problems

1) $P' [sn; a_1, a_2 \dots a_n, a_{k+1} \dots a_{n-q+1}]^q$
wornach die Anzahl der Gruppen bestimmt werden soll, wenn die Versetzungen mit Wiederholungen gebildet werden und dabei die Elemente

$a_{h+1}, a_{h+2}, a_{h+3}, \dots a_k$
von der Mitwirkung ausgeschlossen bleiben.

Um die vorliegende Aufgabe zu lösen, wird die Elementen-Reihe, woraus die Gruppen gebildet werden, ununterbrochen oder vollständig angenommen, darauf werden die Elemente

$a_{h+1}, a_{h+2}, a_{h+3}, \dots a_k, a_{k+1}, \dots a_{n-q+1}$
mit den zugehörigen Summen ausgeschieden, und von der Zahl der ausgeschiedenen Gruppen die Elemente

$a_{k+1}, a_{k+2}, a_{k+3} \dots a_{n-q+1}$
mit den zugehörigen Summen selbst wieder ausgeschieden. Hiernach ist das, zu 3 des vorigen §. angegebene, Verfahren doppelt anzuwenden. Diefs führt zu folgender Darstellung

$$\begin{aligned} & a_{n-q+1} P'(s[q-1])^{q-1} - a_{n-q+1} P'(s[q-1])^{q-1} \\ & a_{n-q} P'(s[q])^{q-1} - a_{n-q} P'(s[q])^{q-1} \\ & a_{n-q-1} P'(s[q+1])^{q-1} - a_{n-q-1} P'(s[q+1])^{q-1} \\ & \vdots \\ & a_{k+1} P'(s[n-k-1])^{q-1} - a_{k+1} P'(s[n-k-1])^{q-1} \\ & a_k P'(s[n-k])^{q-1} \\ & a_{k-1} P'(s[n-k+1])^{q-1} \\ & \vdots \\ & a_{h+2} P'(s[n-h-2])^{q-1} \\ & a_{h+1} P'(s[n-h-1])^{q-1} \\ & (a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{n-q+1}) \end{aligned}$$

Werden die Zahlenausdrücke in diese Darstellung eingeführt und die erhaltenen Resultate, wie unter 3 des vorigen §. geschah, summirt, so ergibt sich folgender Zahlenausdruck für die von der Gesamtzahl abzuziehende Gruppenzahl.

$$2) A_1 = q \cdot \left(\frac{(n-h-1)^{q-1}}{1^{q-1}} - \frac{(n-k-1)^{q-1}}{1^{q-1}} \right)$$

Bei diesem Ausscheiden sind, wie man erkennt, zu viele Gruppen ausgeschieden worden. Diefs tritt ein, wenn der Werth der Stellen-

$$3) A_2 = \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} \left(\frac{(n-2h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - \frac{(n-h-k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right) - \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} \left(\frac{(n-h-k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - \frac{(n-2k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right) \\ = \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} \left(\frac{(n-2h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - 2 \frac{(n-h-k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} + \frac{(n-2k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right)$$

Wird diese Entwicklungsweise weiter fortgeführt, so entsteht für die Zahl der ferner auszuscheidenden Gruppen, welche durch Ausstossen eines neuen Elementes gewonnen wird, folgende Darstellung

$$4) A_3 = \frac{q^{3|-1}}{1^{3|-1}} \left(\frac{(n-3h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - 2 \frac{(n-2h-k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} + \frac{(n-h-2k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right) - \frac{q^{3|-1}}{1^{3|-1}} \left(\frac{(n-2h-k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - 2 \frac{(n-h-2k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} + \frac{(n-3k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right) \\ = \frac{q^{3|-1}}{1^{3|-1}} \left(\frac{(n-3h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - 3 \frac{(n-2h-k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} + 3 \frac{(n-h-2k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - \frac{(n-3k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right)$$

Werden die gefundenen Ausdrücke vereinigt, so ergibt sich zur Auflösung der unter 1 vorgelegten Aufgabe folgende Gleichung

$$5) P'[sn; a_1, a_2, a_3, \dots, a_k, a_{h+1}, a_{h+2}, \dots, a_{n-q+1}]^q = \frac{(n-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - q \left(\frac{(n-h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - \frac{(n-k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right) + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} \left(\frac{(n-2h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - 2 \frac{(n-k-k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} + \frac{(n-2k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right) - \frac{q^{3|-1}}{1^{3|-1}} \left(\frac{(n-3h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - 3 \frac{(n-2h-k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} + 3 \frac{(n-h-2k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} - \frac{(n-3k-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right) \\ \vdots$$

oder

$$6) P'[sn; a_1, a_2, a_3, \dots, a_h, a_{h+1}, a_{h+2}, \dots, a_{n-q+1}]^q = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|-1}} \left(\sum_{m=y+z}^{m=y+z} (-)^z \frac{(z+y)^{z+y|-1}}{1^{z|-1} 1^{y|-1}} \frac{(n-yh-zk-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} \right)$$

Hier gilt folgende Bedingungsgleichung

$$m = y + z = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

Für jeden besondern Werth von x sind für die Grössen y + z in dem Ausdrücke yh + zk der Fakultät $\frac{(n-yh-zk-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}}$ die Versetzungen mit Wiederholungen in der zweiten Classe zu der Summe, welche gerade der Werth von x angibt, aus den Elementen 0, 1, 2, 3, ... x

zu setzen. Im vorliegenden Falle ergeben sich folgende Bedeutungen

y z,	y z,	y z,	y z,	y z,	...
0 0	1 0	0 2	0 3	0 4	
	0 1	1 1	1 2	1 3	
		2 0	2 1	2 2	
			3 0	3 1	
				4 0	

Setzt man $k-h=d$ in der Gleichung 5, so gewinnt man auch folgende Darstellung:

$$6) P' [sn; a_1, a_2, \dots, a_h, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_{n-q+1}]^q =$$

$$\frac{(n-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|1}} - \frac{q}{1} \left(\frac{(n-h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|1}} - \frac{(n-h-d-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|1}} \right)$$

$$+ \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(n-2h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|1}} - 2 \frac{(n-2h-d-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|1}} + \frac{(n-2h-2d-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|1}} \right)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

§. 3.

Der Gang der Untersuchung führt zu folgender Aufgabe

$$1) P' [sn; a_1, a_2, \dots, a_h, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_p]^q$$

Bei Bildung der Gruppen der Versetzungen mit Wiederholungen sollen hiernach die Elemente $a_{h+1}, a_{h+2}, \dots, a_k$ und $a_{p+1}, a_{p+2}, \dots, a_{n-q+1}$ nicht mitwirken.

Um die vorstehende Aufgabe zu lösen, wird auch hier die Elementen-Reihe ununterbrochen angenommen, darauf werden die die Elemente

$$a_{h+1}, a_{h+2}, a_{h+3}, \dots, a_{n-q+1}$$

mit den zugehörigen Summen ausgeschieden, hievon selbst wieder die Elemente

$$a_{k+1}, a_{k+2}, a_{k+3}, \dots, a_{n-q+1}$$

mit den zugehörigen Summen und endlich von letztern die, welche mit den Elementen

$$a_{p+1}, a_{p+2}, a_{p+3}, \dots, a_{n-q+1}$$

verbunden sind. Derselbe Zweck wird auch erreicht, wenn man bei der Ausscheidung der Elemente

das zu §. 2, Nro. 2 angegebene Verfahren anwendet. Diefs führt zu folgender Darstellung

$$\begin{array}{l} a_{n-q+1} P'(s[q-1])^{q-1} - a_{n-q+1} P'(s[q-1])^{q-1} + a_{n-q+1} P'(s[q-1])^{q-1} \\ a_{n-q} P'(s[q-1])^{q-1} - a_{n-q} P'(s[q-1])^{q-1} + a_{n-q} P'(s[q-1])^{q-1} \\ \vdots \\ a_{h+1} P'(s[n-h-1])^{q-1} - a_{h+1} P'(s[n-h-1])^{q-1} + a_{h+1} P'(s[n-h-1])^{q-1} \end{array}$$

Benützt man die zu §. 1 gemachten Bemerkungen, so gewinnt man hieraus zur Bestimmung der erforderlichen Gruppen-Anzahl folgenden Ausdruck

$$2) A_1 = q \left(\frac{(n-h-1)^{q-1}}{1^{q-1}} - \frac{(n-k-1)^{q-1}}{1^{q-1}} + \frac{(n-p-1)^{q-1}}{1^{q-1}} \right)$$

In diesem Ausdrucke sind zu viele Gruppen begriffen. Um den Ueberschuß zu erhalten, wird, wie früher, ein weiteres Element aus den begleitenden Summen ausgeschieden. Die Gruppen werden auf die ununterbrochene Elementen-Reihe zurückgeführt, und die Ausscheidungen in Beziehung auf die drei Elementen-Reihen

$$\begin{array}{l} a_{h+1}, a_{h+2}, \dots, a_{n-q+1} \\ a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_{n-q+1} \\ a_{p+1}, a_{p+2}, \dots, a_{n-q+1} \end{array}$$

gemacht, die den eben angeführten Gesetzen unterliegen, und zugleich nach den frühern gemachten Bemerkungen behandelt werden. Diefs führt zu folgender Darstellung

$$\begin{array}{l} a_{h+1} \left| \begin{array}{l} a_{n-h-q+1} P'(s[q-2])^{q-2} \\ a_{n-h-q} P'(s[q-1])^{q-2} \\ a_{n-h-q-1} P'(s[q-1])^{q-2} \\ \vdots \\ a_{h+1} P'(s[n-2h-2])^{q-2} \end{array} \right. + a_{h+2} \left| \begin{array}{l} a_{n-h-q} P'([q-2])^{q-2} \\ a_{n-h-q-1} P'(s[q-1])^{q-2} \\ a_{n-h-q-2} P'(s[q-1])^{q-2} \\ \vdots \\ a_{h+1} P'(s[n-2h-3])^{q-2} \end{array} \right. + \dots + a_{n-h-q+1} a_{h+1} P'(s[q-2])^{q-2} \\ - a_{k+1} \left| \begin{array}{l} a_{n-k-q+1} P'(s[q-2])^{q-2} \\ a_{n-k-q} P'(s[q-1])^{q-2} \\ a_{n-k-q-1} P'(s[q-1])^{q-2} \\ \vdots \\ a_{h+1} P'(s[n-h-k-2])^{q-2} \end{array} \right. - a_{k+2} \left| \begin{array}{l} a_{n-k-q} P'(s[q-2])^{q-2} \\ a_{n-k-q-1} P'(s[q-1])^{q-2} \\ a_{n-k-q-2} P'(s[q-1])^{q-2} \\ \vdots \\ a_{h+1} P'(s[n-k-h-3])^{q-2} \end{array} \right. - \dots - a_{n-k-q+1} a_{k+1} P'(s[q-2])^{q-2} \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & + a_{p+1} \begin{vmatrix} a_{n-p-q+1} P'(s[q-2])^{q-2} & + a_{p+2} a_{n-p-q} P'(s[q-2])^{q-2} \dots + a_{n-p-q+1} a_{p+1} P'(s[q-2])^{q-2} \\ a_{n-p-q} P'(s[q-1])^{q-2} & a_{n-p-q-1} P'(s[q-1])^{q-2} \\ a_{n-p-q-1} P'(s[q])^{q-2} & a_{n-p-q-2} P'(s[q])^{q-2} \\ \vdots & \vdots \\ a_{h+1} P'(s[n-p-h-2])^{q-2} & a_{h+1} P'(s[n-p-h-3])^{q-2} \end{vmatrix} \\
 & (a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)
 \end{aligned}$$

Werden nun die eben gemachten Bemerkungen mit den, zu Nro. 2 §. 2 und Nro. 4 §. 2 gemachten, in Verbindung gebracht, so ergibt sich zur Bestimmung des hiezu gehörigen Zahlenausdrucks folgende Darstellung

$$\begin{aligned}
 3) A_2 &= q^{2|1} \cdot \frac{1}{1^{q-1|1}} \left((n-2h-1)^{q-1|1} - (n-h-k-1)^{q-1|1} + (n-h-p-1)^{q-1|1} \right. \\
 &\quad \left. - (n-h-k-1)^{q-1|1} + (n-2k-1)^{q-1|1} - (n-k-p-1)^{q-1|1} \right. \\
 &\quad \left. + (n-p-h-1)^{q-1|1} - (n-p-k-1)^{q-1|1} + (n-2p-1)^{q-1|1} \right) \\
 &= \frac{q^{2|1}}{1^{q-1|1}} \left(\frac{(n-2h-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} - 2 \frac{(n-h-k-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} + 2 \frac{(n-h-p-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} - 2 \frac{(n-k-p-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{(n-2k-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} + \frac{(n-2p-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} \right)
 \end{aligned}$$

Wird nun ein weiteres Element ausgeschieden und diese Schlussweise fortgesetzt, so entsteht:

$$\begin{aligned}
 4) A_3 &= \frac{q^{3|1}}{1^{q-1|1}} \frac{1}{1^{q-1|1}} \left[(n-3h-1)^{q-1|1} - 2(n-2h-k-1)^{q-1|1} + 2(n-2h-p-1)^{q-1|1} \right. \\
 &\quad \left. - 2(n-h-k-p-1)^{q-1|1} + (n-h-2k-1)^{q-1|1} + (n-h-2p-1)^{q-1|1} - (n-k-2h-1)^{q-1|1} \right. \\
 &\quad \left. + 2(n-h-2k-1)^{q-1|1} - 2(n-k-h-p-1)^{q-1|1} + 2(n-2k-p-1)^{q-1|1} - (n-3k-1)^{q-1|1} \right. \\
 &\quad \left. - (n-k-2p-1)^{q-1|1} + (n-p-2h-1)^{q-1|1} - 2(n-p-h-k-1)^{q-1|1} + 2(n-2p-h-1)^{q-1|1} \right. \\
 &\quad \left. - 2(n-k-2p-1)^{q-1|1} + (n-2k-p-1)^{q-1|1} + (n-3p-1)^{q-1|1} \right] \\
 &= \frac{q^{3|1}}{1^{q-1|1}} \frac{1}{q^{q-1|1}} \left[(n-3h-1)^{q-1|1} - 3(n-2h-k-1)^{q-1|1} + 3(n-2h-p-1)^{q-1|1} \right. \\
 &\quad \left. + 3(n-h-2k-1)^{q-1|1} - 6(n-h-k-p-1)^{q-1|1} + 3(n-h-2p-1)^{q-1|1} \right. \\
 &\quad \left. - (n-3k-1)^{q-1|1} + 3(n-2k-p-1)^{q-1|1} - 3(n-k-2p-1)^{q-1|1} + (n-3p-1)^{q-1|1} \right]
 \end{aligned}$$

Die Ableitung von 4 ergibt sich aus 3 leicht, wenn allmählig $n-h$, $n-k$, $n-p$ statt n in 3 gesetzt wird. Die weiteren Ableitungen ergeben sich auf gleiche Weise. Es ist für die unter 1 vorgelegte Aufgabe

$$\begin{aligned}
(5) \quad P'[\text{sn}; a_1, a_2 \dots a_h, a_{k+1}, a_{k+2} \dots a_p]^q &= A_0 - A_1 + A_2 - A_3 \dots \\
&= \frac{(n-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|1}} - \frac{q^{1|-1}}{1^{1|1}} \cdot \frac{1}{1^{q-1|1}} \left((n-h-1)^{q-1|-1} - (n-k-1)^{q-1|-1} + (n-p-1)^{q-1|-1} \right) \\
&+ \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \cdot \frac{1}{1^{q-1|1}} \left((n-2h-1)^{q-1|-1} - 2 \left| \begin{array}{l} (n-h-k-1)^{q-1|-1} + \frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 2} (n-2k-1)^{q-1|-1} \\ -(n-h-p-1)^{q-1|-1} \end{array} \right| - 2(n-k-p-1)^{q-1|-1} \right. \\
&\quad \left. (n-2p-1)^{q-1|-1} \right) \\
&- \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} \cdot \frac{1}{1^{q-1|1}} \left((n-3h-1)^{q-1|-1} - 3 \left| \begin{array}{l} (n-2h-k-1)^{q-1|-1} + \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 2} (n-h-2k-1)^{q-1|-1} \\ -(n-2h-p-1)^{q-1|-1} \end{array} \right| \right. \\
&\quad \left. \begin{array}{l} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right| \begin{array}{l} -2(n-h-k-p-1)^{q-1|-1} \\ \vdots \\ +(n-h-2p-1)^{q-1|-1} \end{array} \right) \\
&\quad - \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3} (n-3k-1)^{q-1|-1} \\
&\quad - \frac{3}{1} (n-2k-p-1)^{q-1|-1} \\
&\quad + \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 2} (n-k-2p-1)^{q-1|-1} \\
&\quad \left(- \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3} (n-3p-1)^{q-1|-1} \right)
\end{aligned}$$

oder

$$6) P' [sn; a_1, a_2, \dots, a_h, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_p]^q = \sum_{x=0}^{x=q} (-1)^x \frac{q^{x|1-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{x=w+y+z} (-1)^y \cdot \frac{(w+y+z)^{w+y+z|1-1} (n-wh-yk-zp-1)^{q-1|1-1}}{1^{w|1} 1^{y|1} 1^{z|1}} \right)$$

Hiebei gelten die Bedingungsgleichungen, wornach

$$x = 0, 1, 2, 3 \dots q$$

und für jeden einzelnen Werth von x

$$x = w + y + z$$

ist, wornach ferner statt w, y, z alle möglichen Summen der Versetzungen mit Wiederholungen in der dritten Classe aus den Elementen $0, 1, 2, \dots, x$ gebildet, die betreffenden Werthe für w, y, z in das vorstehende Symbol eingeführt werden sollen. Es ist also:

w y z,	w y z,	w y z,	w y z
0 0 0	0 0 1	0 0 2	0 0 3
	0 1 0	0 1 1	0 1 2
	1 0 0	0 2 0	0 2 1
		1 0 1	0 3 0
		1 1 0	1 0 2
		2 0 0	1 1 1
			1 2 0
			2 0 1
			2 1 0
			3 0 0

Mittelst dieser Bemerkungen läßt sich nun das allgemeine Gesetz, das alle Gebilde dieser Art in sich begreift, leicht darstellen. Es ist in folgendem Ausdrücke enthalten.

$$\begin{aligned}
 & 9) P'[\text{sn}; a_1, a_2, a_3, \dots, a_{r_1} \\
 & \quad a_{p_2+1}, a_{p_2+2}, a_{p_2+3}, \dots, a_{r_2} \\
 & \quad a_{p_3+1}, a_{p_3+2}, a_{p_3+3}, \dots, a_{r_3} \\
 & \quad a_{p_4+1}, a_{p_4+2}, a_{p_4+3}, \dots, a_{r_4} \\
 & \quad \vdots \\
 & \quad a_{p_h+1}, a_{p_h+2}, a_{p_h+3}, \dots, a_{r_h} \\
 & = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{x=m}^{x=m} (-)^{y_2+y_3+\dots+y_h} \frac{m^{m-1}}{1^{z_1-1} 1^{z_2-1} \dots 1^{z_h-1} 1^{y_2-1} 1^{y_3-1} \dots 1^{y_h-1}} \right. \\
 & \quad \left. \times \frac{(n-z_1 r_1 - z_2 r_2 - \dots - z_h r_h - y_2 p_2 - y_3 p_3 - \dots - y_h p_h - 1)^{q-1-1}}{1^{q-1-1}} \right)
 \end{aligned}$$

wenn $x=0, 1, 2, 3, 4 \dots q$ und für jeden Werth von x .

$$x = y_2 + y_3 + y_4 \dots y_h + z_1 + z_2 + z_3 + \dots z_h$$

wenn ferner

$$m = y_2 + y_3 + \dots y_h + z_1 + z_2 + z_3 \dots z_h$$

und aus m alle möglichen Summen der Versetzungen mit Wiederholungen aus den Elementen $0, 1, 2, 3 \dots x$ zur so vielen Classe gebildet werden, welche entsteht, wenn die Gröfsen

$$y_2, y_3, \dots y_h, z_1, z_2, z_3 \dots z_h$$

als Einheiten betrachtet werden. Dieß weist auf die $(2h-1)^{\text{te}}$ Classe, wenn r_h kleiner als $n-q+1$ ist. Dabei ist zu bemerken, daß sich die Buchstaben

$$y_2, y_3, y_4, \dots y_h$$

auf die Stellenzahlen $p_2, p_3, p_4 \dots p_h$ und

$$z_1, z_2, z_3, \dots z_h$$

auf $r_1, r_2, r_3, r_4 \dots r_h$ beziehen.

§. 4.

Die in dem Vorhergehenden gefundenen Resultate sind vieler Anwendungen fähig. Diese erstrecken sich nicht nur auf die Combina-

tionen selbst, sondern auf eine besondere Classe von Polynomien, die eigens durch sie entwickelt werden können, und auf Wahrscheinlichkeits-Rechnung.

Die Anwendbarkeit dieser Gleichungen auf Combinationen ergibt sich aus §. 18 meiner Combinations-Lehre. Aus den dort gegebenen Sätzen leiten sich leicht folgende ab

$$1) P' [sn; a_{r+1}, a_{r+2}, a_{r+3} \dots a_m]^q = P' [s(n-fq); a_1, a_2, \dots a_{m-f}]^q$$

$$2) P' [sn; a_{-f}, a_{-f+1}, \dots a_m]^q = P' [s(n+(f+1)q); a_1, a_2, \dots a_{m+f+1}]^q$$

$$3) P' [sn; a_{f+1}, a_{f+2}, \dots a_{r_1}, a_{p_2+1}, a_{p_2+2} \dots a_{r_2}, \dots a_{p_h+1} \dots a_{r_h}]^q =$$

$$= P' [s(n-fq); a_1, a_2 \dots a_{r_1-f}, a_{p_2+1-f}, \dots a_{r_h-f}]^q$$

$$4) P' [sn; a_{-f}, a_{-f+1}, \dots a_{r_1}, a_{p_2+1}, a_{p_2+2} \dots a_{r_2}, \dots a_{p_h+1} \dots a_{r_h}]^q =$$

$$= P' [s(n+(f+1)q); a_1, a_2 \dots a_{r_1+f+1}, a_{p_2+1+f}, a_{p_2+2+f} \dots a_{r_h+f}]^q$$

Setzt man nun nach 3 $n-fq=n_1$, $r_1-f=s_1$, $r_2-f=s_2$ $r_h-f=s_h$ und $p_2-f=t_2$, $p_3-f=t_3$... $p_h-f=t_h$, so ergibt sich aus Nro. 9 §. 3 folgende Darstellung:

$$5) P' [sn; a_{f+1}, a_{f+2}, a_{r+1}, a_{p_2+1}, a_{p_2+2} \dots a_{r_2}, \dots a_{p_h+1}, \dots a_{r_h}]^q$$

$$= \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{x=m}^{x=m} (-)^{y_2+y_3+\dots+y_h} \frac{m^{m-1}}{1^{z_1-1} 1^{z_2-1} \dots 1^{z_h-1} 1^{y_2-1} 1^{y_3-1} \dots 1^{y_h-1}} \right.$$

$$\times \left. \frac{(n_1-z_1 s_1-z_2 s_2 \dots z_h s_h-y_2 t_2 \dots y_h t_h-1)^{q-1-1}}{1^{q-1-1}} \right)$$

Hierin gelten dieselben Bedingungsgleichungen, die zu Nro. 9 §. 3 angegeben wurden. Setzt man nach 4

$$n+(f+1)q = n_1, r_1+f+1 = s_1, r_2+f+1 = s_2 \dots r_h+f+1 = s_h \text{ und}$$

$$p_2+f+1 = t_2, p_3+f+1 = t_3 \dots p_h+f+1 = t_h,$$

so ist aus 9 §. 3

$$6) P' [sn; a_{-f}, a_{-f+1} \dots a_{r_1}, a_{p_2+1}, a_{p_2+2} \dots a_{r_2}, \dots a_{p_h+1}, a_{p_h+2} \dots a_{r_h}]^q$$

$$= \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{x=m}^{x=m} (-)^{y_2+y_3+\dots+y_h} \frac{m^{m-1}}{1^{z_1-1} 1^{z_2-1} \dots 1^{z_h-1} 1^{y_2-1} 1^{y_3-1} \dots 1^{y_h-1}} \right.$$

$$\times \left. \frac{(n_1-z_1 s_1-z_2 s_2 \dots z_h s_h-y_2 t_2-y_3 t_3 \dots -y_h t_h-1)^{q-1-1}}{1^{q-1-1}} \right)$$

Auch hier gelten die nämlichen Bedingungsgleichungen.

Die Gleichung 9 §. 3 und die Gleichungen dieses §. gewinnen dadurch besonders an Anwendbarkeit, daß die Werthe der Stellenzahlen $p_2, p_3, \dots, p_h$ und $r_1, r_2, r_3, \dots, r_h$ unter sich nicht in einem nothwendigen Zusammenhange stehen, sondern unabhängig von einander sind, und willkürlich angenommen, oder in jeden beliebigen Zusammenhang gebracht werden können. Geschieht dieß, so können gar mannigfaltige Folgerungen aus diesen Gleichungen gezogen werden. Dieß wird sich an folgenden Fällen zeigen.

Setzt man nämlich

$p_2 = p_3 = p_4 = \dots, p_h = 0$ und $r_1 = r_2 = r_3 = \dots, r_h = r$ so erhalten alle Elementen-Reihen in 9 §. 3 gleich viele Elemente und es entstehen h Elementen-Reihen. Werden nun in dem zugehörigen Zahlenausdrucke die erforderlichen Veränderungen gemacht, geordnet und die zusammengehörigen Ausdrücke unter sich verbunden, so ergibt sich hieraus folgende Darstellung

$$\begin{aligned} 7) P' [sn; a_1, a_2, a_3 \dots a_r, b_1, b_2, b_3 \dots b_r, c_1, c_2 \dots c_r, \dots h_1, h_2 \dots h_r]^q = \\ = \frac{1}{1^{q-1|-1}} \left((1+q(h-1) + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} (h-1)^2 + \frac{q^{3|-1}}{1^{3|-1}} (h-1)^3 \dots) (n-1)^{q-1|-1} \right. \\ \left. - q \cdot h (1 + \frac{q-1}{1} (h-1) + \frac{(q-1)^{2|-1}}{1^{2|-1}} (h-1)^2 \dots) (n-r-1)^{q-1|-1} \right. \\ \left. + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} h^2 (1 + \frac{q-2}{1} (h-1) + \frac{(q-2)^{2|-1}}{1^{2|-1}} (h-1)^2 \dots) (n-2r-1)^{q-1|-1} \right. \\ \left. \vdots \right) \\ = \frac{h^q}{1^{q-1|-1}} \left((n-1)^{q-1|-1} - \frac{q}{1} (n-r-1)^{q-1|-1} + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} (n-2r-1)^{q-1|-1} - \frac{q^{3|-1}}{1^{3|-1}} (n-3r-1)^{q-1|-1} \dots \right) \end{aligned}$$

Diese Reihe bricht ab, wenn ein Glied in 0 übergehen sollte.

Andere Anwendungen, welche sich aus den Gleichungen dieses §. ergeben, sind folgende

Werden nämlich die zu den Gleichungen 5 und 6 angedeuteten Werthe eingeführt, so ergibt sich für die in 3 angezeigte Gruppenanzahl folgende entwickelte Darstellung, wenn die gehörigen Reductionen gemacht werden

$$8) A = \frac{(n-fq-1)^{q-1}}{1^{q-1}} - \frac{q}{1^{q-1}} \left(\begin{array}{c} (n-[q-1]f-r_1-1)^{q-1} - (n-[q-1]f-p_2-1)^{q-1} \\ (n-[q-1]f-r_2-1)^{q-1} - (n-[q-1]f-p_3-1)^{q-1} \\ \vdots \\ (n-[q-1]f-r_h-1)^{q-1} - (n-[q-1]f-p_h-1)^{q-1} \end{array} \right) \\ + \frac{q^{q-1}}{1^{q-1}} \left(\begin{array}{c} (n-[q-2]f-2r_1-1)^{q-1} + 2(n-[q-2]f-r_1-r_2-1)^{q-1} + \frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 2} (n-[q-2]f-2r_2-1)^{q-1} \\ (n-[q-2]f-r_1-r_3-1)^{q-1} + 2(n-[q-2]f-r_2-r_3-1)^{q-1} \\ \vdots \\ (n-[q-2]f-r_1-r_h-1)^{q-1} + (n-[q-2]f-r_2-p_h-1)^{q-1} \\ - (n-[q-2]f-r_1-p_2-1)^{q-1} \\ - (n-[q-2]f-r_1-p_3-1)^{q-1} \\ \vdots \\ - (n-[q-2]f-r_1-p_h-1)^{q-1} + \frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 2} (n-[q-2]f_1-2p_h-1)^{q-1} \end{array} \right)$$

oder in Zeichen

$$9) A = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{y=0}^{y=m} (-)^y y_2 + y_3 + \dots y_h \right) \frac{m^{m-1}}{1^{m-1}} \times \frac{1}{1^{q-1}} \left(\begin{array}{c} 1 \\ z_1 | 1 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ z_2 | 1 \end{array} \dots \begin{array}{c} 1 \\ z_h | 1 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ y_2 | 1 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ y_3 | 1 \end{array} \dots \begin{array}{c} 1 \\ y_h | 1 \end{array} \right)$$

Hierin ist allmählig 0, 1, 2, ... q statt x zu setzen und für jeden einzelnen Werth von x nach dem zweiten $\sum$ $x = m = y_2 + y_3 + y_4 + \dots y_h + z_1 + z_2 + \dots z_h$ beizubehalten. Im übrigen gelten die oben angegebenen Gesetze.

Werden die gleichen Bemerkungen auf die Darstellungen 4 und 6 angewendet, so ergibt sich, wenn die erste Reihe mit dem Elemente a.f+1 statt mit a.f beginnt.

so finden wir

$$11) \sum_{n=q}^{\infty} P' [sn; a_1, a_2, a_3, \dots, a_r]^q = \\ = \frac{n^{q-1}}{1^{q-1}} - q \cdot \frac{(n-r)^{q-1}}{1^{q-1}} + \frac{q^{2-1}}{1^{2-1}} \frac{(n-2r)^{q-1}}{1^{q-1}} - \frac{q^{3-1}}{1^{3-1}} \frac{(n-3r)^{q-1}}{1^{q-1}} + \dots$$

Dieselbe Methode führt bei den übrigen Fällen leicht zum Ziele. Deswegen ergibt sich ganz allgemein aus 9 §. 3.

$$12) \sum_{n=q}^{\infty} P' [sn; a_1, a_2, a_3, \dots, a_{r_1}, \\ a_{p_2+1}, a_{p_2+2}, \dots, a_{r_2}, \\ a_{p_3+1}, a_{p_3+2}, \dots, a_{r_3}, \\ \vdots \\ a_{p_h+1}, a_{p_h+2}, \dots, a_{r_h}]^q = \\ = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{y=0}^{y=m} (-)^{y_2+y_3+\dots+y_h} \frac{m^{m-1}}{1^{z_1|1} 1^{z_2|1} \dots 1^{z_h|1} 1^{y_2|1} 1^{y_3|1} \dots 1^{y_h|1}} \right. \\ \left. \times \frac{(n-z_1 r_1 - z_2 r_2 - \dots - z_h r_h - y_2 p_2 - y_3 p_3 - \dots - y_h p_h)^{q-1}}{1^{q-1}} \right)$$

Die Bedingungsgleichungen, welche oben angegeben wurden, gelten auch hier. Dieselbe Methode läßt sich leicht auf die in 5 — 10 gefundenen Gleichungen und alle hieher gehörigen Fälle ausdehnen.

§. 5.

Die combinatorische Analysis gewinnt aus den bisher gefundenen Resultaten eine nicht unbedeutende Ausbeute, indem sie mit ihrer Hülfe eine besondere Classe von Polynomen potenziren lehrt. Hieher gehören alle Polynomen mit beschränkter, oder auf irgend eine Weise unterbrochener Gliederanzahl. Es ist bekanntlich

$$(a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots)^q = \\ = P' s^q x^q + P' s(q+1)^q x^{q+1} + P' s(q+2)^q x^{q+2} + P' s(q+3)^q x^{q+3} + \dots$$

wenn

$$P' s^q, P' s(q+1)^q, P' s(q+2)^q, \dots$$

die Versetzungen mit Wiederholungen in der q^{ten} Classe zu den verschiedenen Summen, der Kürze wegen, bezeichnen.

Ist die Gliederanzahl des Polynomiums beschränkt, so ergibt sich hieraus unmittelbar

$$1) (a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots + a_r x^r)^q = \\ = P'sq^q x^q + P's(q+1)^q x^{q+1} + P's(q+2)^q x^{q+2} + \dots + P's(qr)^q x^{qr} \\ (a_1, a_2, a_3, \dots, a_r)$$

Die Summen der Versetzungen mit Wiederholungen und Exponenten von x erheben sich bis qr . Ist $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_r = 1$, so geht die Gleichung 1 in folgende über

$$2) (x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^r)^q = \\ = P's[q]^q x^q + P's[q+1]^q x^{q+1} + P's[q+2]^q x^{q+2} + \dots + P's[qr]^q x^{qr} \\ (a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_r)$$

Die Werthe für

$$P's[q]^q, P's[q+1]^q, P's[q+2]^q, \dots$$

sind in §. 1 Nro. 6 angegeben.

Ist die Gliederanzahl des Polynomiums beschränkt und unterbrochen, so ist

$$3) (a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_h x^h + a_{k+1}x^{k+1} + a_{k+2}x^{k+2} + \dots + a_p x^p)^q = \\ = P'sq^q x^q + P's(q+1)^q x^{q+1} + P's(q+2)^q x^{q+2} + \dots + P's(pq)^q x^{pq} \\ (a_1, a_2, a_3, \dots, a_h, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_p)$$

Wird

$$a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = \dots = a_h = a_{k+1} = \dots = a_p = 1,$$

so geht die vorstehende Gleichung in folgende über

$$4) (x + x^2 + x^3 + \dots + x^h + x^{k+1} + x^{k+2} + \dots + x^p)^q = \\ P's[q]^q x^q + P's[q+1]^q x^{q+1} + P's[q+2]^q x^{q+2} + \dots + P's[pq]^q x^{pq} \\ (a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_h, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_p)$$

Die Werthe für die Vorzahlen der Potenzen von x in der entwickelten Darstellung ergeben sich aus §. 3, 5 oder 6.

Eben so ist

$$5) (a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{r_1} x^{r_1} + a_{p_2+1} x^{p_2+1} + \dots + a_{r_2} x^{r_2} + a_{p_h+1} x^{p_h+1} + \dots + a_{r_h} x^{r_h})^q = \\ P'sq^q x^q + P's(q+1)^q x^{q+1} + P's(q+2)^q x^{q+2} + \dots + P's(r_h q)^q x^{r_h q} \\ (a_1, a_2, \dots, a_{r_1}, a_{p_2+1}, a_{p_2+2}, \dots, a_{r_2}, \dots, a_{p_h+1}, a_{p_h+2}, \dots, a_{r_h})$$

und

$$6) (x^1 + x^2 + \dots x^{r_1} + x^{p_2+1} \dots x^{r_2} \dots x^{p_h+1} + x^{p_h+2} \dots x^{r_h})^q = \\ = P'/s[q]^q x^q + P'/s[q+1]^q x^{q+1} + P'/s[q+2]^q x^{q+2} \dots P'/s[qr_h]^q x^{qr_h} \\ (a_1, a_2, a_3 \dots a_{r_1}, a_{p_2+1}, a_{p_2+2}, \dots a_{r_2}, \dots a_{p_h+1}, a_{p_h+2} \dots a_{r_h})$$

Die Werthe für diese allgemeine Darstellung ergeben sich aus der Gleichung 9 §. 3.

Mit Hülfe der in §. 1 — 4 gefundenen Sätze lassen sich Anwendungen auf die Erhebung der Polynomien in negative Potenzen machen. Es ist bekanntlich (s. m. Differenzial und Differenzen-Calcul Pg. 96 Nro. 119 u. ff.)

$$7) \frac{1}{(1-a_1x-a_2x^2-a_3x^3\dots)}^q = 1 + q P' s^1 x + q P' s^2 x^2 + q P' s^3 x^3 + \dots \\ \left(\frac{q}{1} \right)^{2|1} P' s^2 x^2 \quad \left(\frac{q}{1} \right)^{2|1} P' s^3 x^3 \\ \left(\frac{q}{1} \right)^{3|1} P' s^3 x^3$$

also auch

$$8) \frac{1}{(1-a_1x-a_2x^2-\dots-a_r x^r)}^q = 1 + q P' s^1 x + q P' s^2 x^2 + q P' s^3 x^3 + q P' s^4 x^4 + \dots x^4 \dots \\ \left(\frac{q}{1} \right)^{2|1} P' s^2 x^2 \quad \left(\frac{q}{1} \right)^{2|1} P' s^3 x^3 \quad \left(\frac{q}{1} \right)^{2|1} P' s^4 x^4 \\ \left(\frac{q}{1} \right)^{3|1} P' s^3 x^3 \quad \left(\frac{q}{1} \right)^{3|1} P' s^4 x^4 \\ \left(\frac{q}{1} \right)^{4|1} P' s^4 x^4$$

und allgemein

$$9) \frac{1}{(1-a_1x-a_2x^2-a_{p_2+1}x^{p_2+1}-\dots-a_{r_2}x^{r_2}-\dots-a_{p_h+1}x^{p_h+1}-\dots-a_{r_h}x^{r_h})}^q \\ = 1 + q P' s^1 x + q P' s^2 x^2 + q P' s^3 x^3 + q P' s^4 x^4 + \dots \\ \left(\frac{q}{1} \right)^{2|1} P' s^2 x^2 \quad \left(\frac{q}{1} \right)^{2|1} P' s^3 x^3 \quad \left(\frac{q}{1} \right)^{2|1} P' s^4 x^4 \\ \left(\frac{q}{1} \right)^{3|1} P' s^3 x^3 \quad \left(\frac{q}{1} \right)^{3|1} P' s^4 x^4 \\ \left(\frac{q}{1} \right)^{4|1} P' s^4 x^4$$

$$(a_1, a_2, \dots a_{r_1}, a_{p_2+1}, a_{p_2+2}, \dots a_{r_2}, \dots a_{p_h+1}, \dots a_{r_h})$$

Wird

$a_1 = a_2 = a_3 = a_{r_1} = a_{p_2+1} = \dots a_{p_h+1} = \dots = a_{r_h} = 1$ gesetzt, so ist

$$^{10)} (1 - x - x^2 - x^3 \dots - x^{r_1} - x^{p_2+1} - x^{p_2+2} \dots - x^{r_2} - \dots - x^{p_h+1} - \dots - x^{r_h})^q =$$

$$= 1 + q P' s[1]^1 x + q P' s[2]^1 x^2 + q P' s[3]^1 x^3 + q P' s[4]^1 x^4 + \dots$$

$$\left(\begin{matrix} \left(\frac{q}{1}\right)^{2|1} P' s[2]^2 & \left(\frac{q}{1}\right)^{2|1} P' s[3]^2 & \left(\frac{q}{1}\right)^{2|1} P' s[4]^2 \\ \left(\frac{q}{1}\right)^{3|1} P' s[3]^3 & \left(\frac{q}{1}\right)^{3|1} P' s[4]^3 \\ \left(\frac{q}{1}\right)^{4|1} P' s[4]^4 \end{matrix} \right| x^3 + q P' s[4]^1 x^4 + \dots$$

$(a_1, a_2, \dots a_{r_1}, a_{p_2+1}, a_{p_2+2}, \dots a_{r_2}, \dots a_{p_h+1}, \dots a_{r_h})$

Die hier angezeigten Vorzahlen von x sind nach den, in §. 1 — 3 gefundenen, Gleichungen zu entwickeln.

Durch diese Hilfsmittel läßt sich auch

$$\frac{(b_1 + b_2 x + \dots b_{s_1} x^{s_1-1} + b_{t_2+1} x^t + b_{t_2+2} x^{t_2+1} \dots b_{s_2} x^{s_2-1} + b_{t_k+1} x^{t_k} \dots b_{s_k} x^{s_k-1})^n}{(1 - a_1 x - a_2 x^2 \dots - a_{r_1} x^{r_1} - a_{p_2+1} x^{p_2+1} - \dots - a_{r_2} x^{r_2} - \dots - a_{p_h} x^{p_h} \dots - a_{r_h} x^{r_h})^q}$$

in eine nach den Potenzen von x fortlaufende Reihe entwickeln, wenn §. 71 u. ff. m. Diff. Calculs berücksichtigt wird.

Es zeigt sich, von welcher Anwendung die in §. 1 — 4 gefundenen Gleichungen in der Analysis sind, denn sie geben die Entwicklung einer grossen Reihe von Polynomen, die bisher in diesem Zweige der Mathematik, so viel uns bekannt ist, nicht berührt wurden, und die eine Stelle in einer Darstellung der Analysis einnehmen, sie mag auf combinatorischem, oder analytischem Wege gegeben werden.

Die in diesem §. gefundenen Resultate sind besonders auch in der Beziehung wichtig, als sie einen Weg zur Aufsuchung neuer Entwicklungen eröffnen. Die Gleichungen 2, 4, 6 etc. zeigen nämlich, wie die Gruppenanzahlen der Versetzungen mit Wiederholungen zu bestimmten Summen zur Darstellung der Vorzahlen der Polynomen benützt werden können. Hiebei wurden die Gruppenanzahlen

als bekannt angenommen, und der Uebergang von ihnen auf die Polynomen gemacht. Nun können wir den umgekehrten Weg einschlagen, können die entwickelte Darstellung der Polynomen als bekannt annehmen, oder irgend ein Mittel zu ihrer Entwicklung feststellen und dann auf die Gruppenanzahl der Versetzungen mit Wiederholungen zu bestimmten Summen übergehen. Beide Wege haben gleichen Zweck und lösen dasselbe Problem. Sie sind nur in der Ausführung verschieden. Wir wollen den ersten bisher benützten Weg den combinatorischen, den letztern, den analytischen Weg nennen, und diesen weiter verfolgen.

Die Art, wie dies weiter verfolgt werden wird, besteht darin, daß ein Polynomium aus der ordnenden GröÙe x gebildet wird, deren Exponenten mit den Stellenzahlen der Elemente übereinstimmen, woraus die Gruppen der Versetzungen mit Wiederholungen erzeugt werden. Die Ausbeute, welche wir auf diesem Weg gewinnen, ist nicht unbedeutend, da die Polynomen leicht geformt und behandelt werden können. Wir wenden uns nun zur Untersuchung einzelner Fälle und stellen die einzelnen Probleme unter einer andern Form dar.

§. 6.

g Elementenreihen sind gegeben, von denen jede k Elemente zählt, und m Elementen-Reihen, von denen jede $(k-h)$ Elemente zählt. Aus den Elementen dieser Reihen sollen die Versetzungen mit Wiederholungen zur Summe n in der q^{ten} Classe gebildet werden. Wie groß ist ihre Gruppenanzahl?

Dieses Problem stellt sich unter folgender Form dar

$$1) A = P'[sn; \begin{matrix} a_1, a_2, & \dots & a_h, a_{h+1}, a_{h+2}, & \dots & a_k \\ b_1, b_2, & \dots & b_h, b_{h+1}, b_{h+2}, & \dots & b_k \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ g_1, g_2, & \dots & g_h, g_{h+1}, g_{h+2}, & \dots & g_k \\ h_{h+1}, h_{h+2}, & \dots & h_k \\ i_{h+1}, i_{h+2}, & \dots & i_k \\ \vdots & & \vdots \\ m_{h+1}, m_{h+2}, & \dots & m_k \end{matrix}]$$

Wird für jede, in diesem Ausdrucke aufgeführte, Elementen-Reihe ein Polynomium von der entsprechenden Gliederanzahl angenommen, dann die Elemente dieser Reihe untereinander und der Einheit gleich gesetzt, wie in §. 5 geschah, oder wird ein Polynomium aus der ordnenden Gröfse gebildet, deren Exponenten mit den Stellenzahlen der Elemente der vorstehenden Reihen zusammenfallen, wird dann das hiedurch entstandene Polynomium entwickelt und die zu x^n gehörige Vorzahl angegeben, so ist das vorgelegte Problem gelöst. Es entsteht

$$Q^q = (gx + gx^2 + gx^3 + \dots gx^h + (g+m)x^{h+1} + (g+m)x^{h+2} + \dots (g+m)x^k)^q \\ = \left(g \frac{x - x^{h+1}}{1-x} + (g+m) \frac{x^{h+1} - x^{k+1}}{1-x} \right)^q = \frac{x^q}{(1-x)^q} (g + mx^h - [g+m]x^k)^q$$

Nun ist

$$2) \frac{x^q}{(1-x)^q} = x^q + \frac{q^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} x^{q+1} + \frac{(q+1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} x^{q+2} + \frac{(q+2)^{q-1|-1}}{1^{q-1|-1}} x^{q+3} + \dots$$

und

$$(g + mx^h - (g+m)x^k)^q = (g + [mx^h - (g+m)x^k])^q = g^q + qg^{q-1}(mx^h - [g+m]x^k) \\ + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} g^{q-2}(mx^h - [g+m]x^k)^2 \\ + \frac{q^{3|-1}}{1^{3|-1}} g^{q-3}(mx^h - [g+m]x^k)^3 \\ \vdots$$

$$= g^q + qg^{q-1}(mx^h - [g+m]x^k) \\ + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} g^{q-2}(m^2x^{2h} - 2m[g+m]x^{h+k} + [g+m]^2x^{2k}) \\ + \frac{q^{3|-1}}{1^{3|-1}} g^{q-3}(m^3x^{3h} - 3m^2[g+m]x^{2h+k} + \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 2} m[g+m]^2x^{h+2k} - [g+m]^3x^{3k}) \\ + \frac{q^{4|-1}}{1^{4|-1}} g^{q-4}(m^4x^{4h} - 4m^3[g+m]x^{3h+k} + \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} m^2[g+m]^2x^{2h+2k} - \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} m[g+m]^3x^{h+3k} + [g+m]^4x^{4k}) \\ \vdots$$

Werden die eben erhaltenen Ausdrücke mit 2 vervielfacht, wird das hiedurch entstehende Resultat nach den Potenzen von x geordnet und die Vorzahl von x^n hervorgehoben, so ergibt sich für die Gruppenanzahl der Versetzungen mit Wiederholungen aus den oben in 1 angegebenen Elementen-Reihen zur Summe n in der q^{ten} Classe

$$\begin{aligned}
 3) A = & g^q \frac{(n-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} + \frac{q}{1} \frac{g^{q-1}}{1^{q-1|1}} [m(n-h-1)^{q-1|1} - (g+m)(n-k-1)^{q-1|1}] \\
 & + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \frac{g^{q-2}}{1^{q-2|1}} [m^2(n-2h-1)^{q-1|1} - 2m(g+m)(n-h-k-1)^{q-1|1} + (g+m)^2(n-2k-1)^{q-1|1}] \\
 & + \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} \frac{g^{q-3}}{1^{q-3|1}} [m^3(n-3h-1)^{q-1|1} - 3m^2(g+m)(n-2h-k-1)^{q-1|1} + 3m(g+m)^2(n-h-2k-1)^{q-1|1} \\
 & \quad - (g+m)^3(n-3k-1)^{q-1|1}] \\
 & \vdots \\
 & \vdots
 \end{aligned}$$

oder

$$4) A = \sum_{x=0}^{x=q} g^{q-x} \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{z=0}^{z=y+z} (-)^z \frac{(y+z)^{x+z|1}}{1^{z|1} 1^{z|1}} m^y (g+m)^z \frac{(n-yh-zk-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} \right)$$

Hiebei gilt die Bedingungsgleichung

$$x = y + z = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

ferner müssen für die einzelnen Werthe von $y + z$ die verschiedenen Summen der Versetzungen mit Wiederholungen zur zweiten Classe aus den betreffenden Elementen gebildet werden, wie dieß bei Nro. 6 §. 2, Pg. 9 geschehen ist.

Die vorstehende Gleichung ist mancher Anwendung fähig. Sie gibt die Gruppenanzahl der Versetzungen mit Wiederholungen aus g Elementen-Reihen, von denen jede k Elemente zählt, sehr leicht, wenn $m=0$ gesetzt wird. Es ist

$$\begin{aligned}
 5) P'[sn; a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k, \dots, g_1, g_2, \dots, g_k]^q = \\
 = \frac{g^q}{1^{q-1|1}} \left((n-1)^{q-1|1} - \frac{q}{1} (n-k-1)^{q-1|1} + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} (n-2k-1)^{q-1|1} - \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} (n-3k-1)^{q-1|1} \dots \right)
 \end{aligned}$$

Dieselbe Gleichung wurde Nro. 7 §. 4, Pg. 16 schon auf anderem Wege gefunden. Wird $k=\infty$, $g=1$ und $m=0$ gesetzt, so entsteht die Gruppenanzahl der Versetzungen mit Wiederholungen aus einer vollständigen Elementen-Reihe zur Summe n in der q^{ten} Classe. Es ist

$$6) P'[sn; a_1, a_2, \dots]^q = \frac{(n-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}}$$

wie bekannt. Ist $g=1$ und $m=0$, so entsteht die Gruppenanzahl der Versetzungen mit Wiederholungen aus k Elementen einer Reihe zur Summe n in der q^{ten} Classe. Es ist

$$7) P'[sn; a_1, a_2, \dots, a_k]^q = \frac{(n-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} - \frac{q(n-k-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} + \frac{q^{2|1-1}(n-2k-1)^{q-1|1-1}}{1^{2|1}} - \dots$$

Dies ist die in 6 Nro. 1, Pg. 5 dargestellte Gleichung.

Das oben unter 1 gegebene Problem läßt auch folgende Form zu

$$8) A_1 = P'[sn; a_1, a_2, \dots, a_h, a_{h+1}, a_{h+2}, \dots, a_k, \\ b_1, b_2, \dots, b_h, b_{h+1}, b_{h+2}, \dots, b_k, \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ g_1, g_2, \dots, g_h, g_{h+1}, g_{h+2}, \dots, g_k, \\ h_1, h_2, \dots, h_h, \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ m_1, m_2, \dots, m_h]^q$$

Um die Gruppenanzahl für 8 zu bestimmen, wird die Entwicklung des Binomiums

$$Q^q = [(g+m)x + (g+m)x^2 + \dots + (g+m)x^h + gx^{h+1} + gx^{h+2} + \dots + gx^k]^q \\ = \left((g+m) \frac{x-x^{h+1}}{1-x} + g \frac{x^{h+1}-x^{k+1}}{1-x} \right)^q = \left(\frac{x}{1-x} \right)^q [(g+m) - mx^h - gx^k]^q$$

nöthig. Es ergibt sich

$$Q^q = \frac{x^q}{(1-x)^q} [g+m - (mx^h + gx^k)]^q = \left(\frac{x}{1-x} \right)^q \left[(g+m)^q - \frac{q}{1} (g+m)^{q-1} (mx^h + gx^k) \right. \\ \left. + \frac{q^{2|1-1}}{1^{2|1}} (g+m)^{q-2} (mx^h + gx^k)^2 \right. \\ \left. - \frac{q^{3|1-1}}{1^{3|1}} (g+m)^{q-3} (mx^h + gx^k)^3 \right. \\ \left. \vdots \quad \vdots \right]$$

Werden die nöthigen Entwicklungen gemacht und auf die unter 2 gewonnene Reihe Rücksicht genommen, so ergibt sich leicht mit Hülfe der Bemerkung, daß $(g+m)$ in der Darstellung 3 an die Stelle von g , g an die Stelle von $(g+m)$ getreten und ein anderer Zeichenwechsel zu beachten ist, folgende Bestimmung für die fragliche Gruppenanzahl

$$9) A_1 = (g+m)^q \frac{(n-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} - \frac{q}{1} (g+m)^{q-1} \left(m \frac{(n-h-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} + g \frac{(n-k-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} \right) \\ + \frac{q^{2|1-1}}{1^{2|1}} (g+m)^{q-2} \left(m^2 \frac{(n-2h-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} + 2mg \frac{(n-h-k-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} + g^2 \frac{(n-2k-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} \right) \\ - \frac{q^{3|1-1}}{1^{3|1}} (g+m)^{q-3} \left(m^3 \frac{(n-3h-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} + 3m^2g \frac{(n-2h-k-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} + 3mg^2 \frac{(n-h-2k-1)^{q-1|1-1}}{1^{q-1|1}} + \dots \right) \\ \vdots \quad \vdots$$

$$\begin{aligned}
 &= (g+m)^q \frac{n^{q-1}}{1^{q-1}} - \frac{q}{1} (g+m)^{q-1} \left(m \frac{(n-h)^{q-1}}{1^{q-1}} + g \frac{(n-k)^{q-1}}{1^{q-1}} \right) \\
 &+ \frac{q^{q-1}}{1^{q-1}} (g+m)^{q-2} \left(m^2 \frac{(n-2h)^{q-1}}{1^{q-1}} + 2mg \frac{(n-h-k)^{q-1}}{1^{q-1}} + g^2 \frac{(n-2k)^{q-1}}{1^{q-1}} \right) \\
 &- \frac{q^{q-1}}{1^{q-1}} (g+m)^{q-3} \left(m^3 \frac{(n-3h)^{q-1}}{1^{q-1}} + 3m^2g \frac{(n-2h-k)^{q-1}}{1^{q-1}} + 3mg^2 \frac{(n-h-2k)^{q-1}}{1^{q-1}} + g^3 \frac{(n-3k)^{q-1}}{1^{q-1}} \right) \\
 &\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots
 \end{aligned}$$

Allgemeiner stellen sich diese Gesetze auf folgende Weise dar

$$\begin{aligned}
 13) \sum_{s+1}^n A &= \sum_{x=0}^{x=q} g^{q-x} \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{y+z=x} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^{y-1} 1^{z-1}} m^y (g+m)^z \frac{(n-yh-zk)^{q-1}}{1^{q-1}} \right) \\
 &- \sum_{x=0}^{x=q} g^{q-x} \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{y+z=x} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^{y-1} 1^{z-1}} m^y (g+m)^z \frac{(s-yh-zk)^{q-1}}{1^{q-1}} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 14) \sum_{s+1}^n A_1 &= \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x (g+m)^{q-x} \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{y+z=x} \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^{y-1} 1^{z-1}} m^y g^z \frac{(n-yh-zk)^{q-1}}{1^{q-1}} \right) \\
 &- \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x (g+m)^{q-x} \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{y+z=x} \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^{y-1} 1^{z-1}} m^y g^z \frac{(s-yh-zk)^{q-1}}{1^{q-1}} \right)
 \end{aligned}$$

In beiden Darstellungen gelten die zu 4 angegebenen Bedingungengleichungen. Unter $\sum_{s+1}^n A$ soll der Inbegriff der Gruppenanzahlen der Versetzungen mit Wiederholungen der Summen $s+1, s+2, s+3, \dots, n$ in der q^{ten} Classe aus den unter 1 angegebenen Elementen-Reihen, unter $\sum_{s+1}^n A_1$ aber dieselben Gruppenanzahlen aus den unter 8 angegebenen Elementen-Reihen verstanden werden.

Wird $s+1=q$ in 13 oder 14 gesetzt, so ergeben sich die unter 11 und 12 gegebenen Darstellungen.

§. 7.

Es sind h Elementen-Reihen gegeben, von denen die erste r Elemente zählt, die zweite ein Element weniger, als die erste, die dritte ein Element weniger, als die zweite u. s. f. Aus den Elementen dieser Reihen werden die Versetzungen mit Wiederholungen zur Summe n in der q^{ten} Classe gebildet. Wie groß ist ihre Gruppenanzahl?

Dieses Problem stellt sich unter folgender Form dar:

$$1) A_1 = P'[\text{sn}; a_1, a_2, a_3, \dots, a_r, \\ b_2, b_3, \dots, b_r, \\ c_3, \dots, c_r, \\ \vdots \\ h_h, h_{h+1}, \dots, h_r]^q$$

Wird für jede Elementen-Reihe dieses Ausdrucks ein Polynomium von der entsprechenden Gliederanzahl angenommen und werden dann die Stellenzahlen auf Exponenten übertragen, so gewinnt man folgende Darstellung

$$Q^q = (x + x^2 + x^3 + \dots x^r + x^2 + x^3 \dots x^r + x^3 + x^4 + \dots x^r \dots + x^h + x^{h+1} \dots x^r)^q \\ = \left(\frac{x + x^2 + x^3 + \dots x^h - hx^{r+1}}{1-x} \right)^q = \left(\frac{x}{1-x} \right)^q \left(\frac{1-x^h}{1-x} - hx^r \right)^q \\ = \frac{x^q}{(1-x)^q} \left(\frac{1-x^h - hx^r + hx^{r+1}}{1-x} \right)^q = \frac{x^q}{(1-x)^{2q}} \left(1 - (x^h + hx^r - hx^{r+1}) \right)^q$$

Nun ist

$$2) \frac{x^q}{(1-x)^{2q}} = x^q + \frac{(2q)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} x^{q+1} + \frac{(2q+1)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} x^{q+2} + \frac{(2q+2)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} + \dots$$

Wird diese Entwicklung mit

$$[1 - (x^h + h(x^r - x^{r+1}))]^q = 1 - \frac{q}{1} (x^h + h(x^r - x^{r+1})) \\ + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} (x^h + h(x^r - x^{r+1}))^2 \\ - \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} (x^h + h(x^r - x^{r+1}))^3 \\ \vdots \\ = 1 - \frac{q}{1} (x^h + h(x^r - x^{r+1})) \\ + q^{2|1} (x^{2h} + 2h(x^{r+h} - x^{h+r+1}) + h^2(x^r - x^{r+1})^2) \\ \vdots$$

vervielfacht, und dann die Form der Vorzahl von x^q bestimmt, so ist damit die gesuchte Gruppenanzahl gefunden. Hiernach wird seyn

oder

$$4) A_1 = \frac{1}{1^{2q-1|1}} \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|1-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{x=w+y+z}^{x=w+y+z} (-)^z \frac{(w+y+z)}{1^{w|1} 1^{y|1} 1^{z|1}} \right)^{w+y+z|1-1} h^{y+z} (n+q-wh-yr-z(r+1)-1)^{2q-1|1-1}$$

w bezieht sich auf h , y auf r und z auf $r+1$. Die übrigen Bedingungen für diese Gleichung fallen mit den zu Nro. 6 §. 3, Pg. 12 angegebenen zusammen.

Man erkennt leicht, daß die Glieder, welche in diesen Ausdrücken vorkommen, die Unterschiede von Fakultäten sind. Die Gleichung 3 läßt sich daher auch auf folgende Weise darstellen,

$$5) A_1 = \frac{(n+q-1)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} - q \left(\frac{(n+q-h-1)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} + h \Delta \frac{(n+q-r-2)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \\ + \frac{q^{2|1-1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(n+q-2h-1)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} + 2h \Delta \frac{(n+q-h-r-2)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} + h^2 \Delta^2 \frac{(n+q-2r-3)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \\ - \frac{q^{3|1-1}}{1^{3|1}} \left(\frac{(n+q-3h-1)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} + 3h \Delta \frac{(n+q-2h-r-2)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} + 3h^2 \Delta^2 \frac{(n+q-h-2r-3)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} + h^3 \Delta^3 \frac{(n+q-3r-4)^{2q-1|1-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \\ \vdots$$

Berücksichtigt man nun die Gleichung

$$6) \Delta^m x^{\frac{p-1}{2}} = \frac{(x+m\Delta x)^{\frac{p-1}{2}}}{1^{\frac{p-1}{2}}} - \frac{m(x+(m-1)\Delta x)^{\frac{p-1}{2}}}{1^{\frac{p-1}{2}}} + \frac{m^2(x+(m-2)\Delta x)^{\frac{p-1}{2}}}{1^{\frac{p-1}{2}}} - \dots (-)^m x^{\frac{p-1}{2}}$$

$$= \frac{p^{\frac{m-1}{2}}}{1^{\frac{p-1}{2}}} (\Delta x)^m x^{\frac{p-m-1}{2}} = \frac{x(x-\Delta x) \dots (x-(p-m+1)\Delta x)}{1 \cdot 2 \dots (p-m)} (\Delta x)^m = \frac{(\Delta x)^m x^{\frac{p-m-1}{2}}}{1^{\frac{p-m-1}{2}}}$$

die sich aus meiner Lehre von den aufsteigenden Funktionen §. 30 leicht folgert, und benützt sie, indem $\Delta x=1$, $p=2q-1$ und statt m und x die erforderlichen Werthe gesetzt werden, so ergibt sich aus 5 folgende Darstellung für das unter 1 vorgelegte Problem.

$$7) A_1 = \frac{(n+q-1)^{2q-1}}{1^{2q-1}} - q \left(\frac{(n+q-h-1)^{2q-1}}{1^{2q-1}} + h \frac{(n+q-r-2)^{2q-2}}{1^{2q-2}} \right)$$

$$+ \frac{q^{2-1}}{1^{2-1}} \left(\frac{(n+q-2h-1)^{2q-1}}{1^{2q-1}} + 2h \frac{(n+q-h-r-2)^{2q-2}}{1^{2q-2}} + h^2 \frac{(n+q-2r-3)^{2q-3}}{1^{2q-3}} \right)$$

$$- \frac{q^{3-1}}{1^{3-1}} \left(\frac{(n+q-3h-1)^{2q-1}}{1^{2q-1}} + 2h \frac{(n+q-2h-r-2)^{2q-2}}{1^{2q-2}} + 3h^2 \frac{(n+q-h-r-3)^{2q-3}}{1^{2q-3}} \dots \right)$$

oder

$$8) A_1 = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{y+z=x} \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^y 1^z} h^z \frac{(n+q-yh-z(r+1)-1)^{2q-z-1}}{1^{2q-z-1}} \right)$$

Die Bedingungsgleichungen fallen mit denen zu 6 §. 2, Pg. 8 angegebenen zusammen, y bezieht sich auf h und z auf $(r+1)$.

Soll die Summe aller Gruppenanzahlen für die Summen von q bis n dargestellt werden, so ist das in §. 4, Pg. 18 angegebene Verfahren auf die Darstellung 3 oder 7 anzuwenden. Wird es auf die letzte angewendet, so ergibt sich

$$9) \sum_{n=q}^{n=n} A_1 = \frac{(n+q)^{2q-1}}{1^{2q-1}} - q \left(\frac{(n+q-h)^{2q-1}}{1^{2q-1}} + h \frac{(n+q-r-1)^{2q-2}}{1^{2q-2}} \right)$$

$$+ \frac{q^{2-1}}{1^{2-1}} \left(\frac{(n+q-2h)^{2q-1}}{1^{2q-1}} + 2h \frac{(n+q-h-r-1)^{2q-2}}{1^{2q-2}} + h^2 \frac{(n+q-2r-2)^{2q-3}}{1^{2q-3}} \right)$$

oder

$$10) \sum_{n=q}^{n=n} A_1 = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{y+z=x} \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^y 1^z} h^z \frac{(n+q-yh-z[r+1])^{2q-z-1}}{1^{2q-z-1}} \right)$$

Ist der Inbegriff aller Summen zwischen m und n also $m+1$, $m+2$, $m+3$, ... n zu bestimmen, so ergibt sich, wenn die in 13 und 14 des vorigen § gebrauchte Bezeichnungsweise beibehalten wird.

$$11) \sum_{m+1} A_1 = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x} \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} h^z \frac{(n+q-yh-z[r+1])^{2q-x-1}}{1^{2q-x|1}} \right) \\ - \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x} \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} h^z \frac{(m+q-yh-z[r+1])^{2q-x-1}}{1^{2q-x|1}} \right)$$

und bei entwickelter Darstellung

$$12) \sum_{m+1}^n A_1 = \frac{(n+q)^{2q-1}}{1^{2q|1}} - \frac{q}{1} \left(\frac{(n+q-h)^{2q-1}}{1^{2q|1}} + h \frac{(n+q-r-1)^{2q-1-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \\ + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(n+q-2h)^{2q-1}}{1^{2q|1}} + 2h \frac{(n+q-h-r-1)^{2q-1-1}}{1^{2q-1|1}} + h^2 \frac{(n+q-2r-2)^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1}} \right) \\ \vdots \\ - \frac{(m+q)^{2q-1}}{1^{2q|1}} + \frac{q}{1} \left(\frac{(m+q-h)^{2q-1}}{1^{2q|1}} + h \frac{(m+q-r-1)^{2q-1-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \\ - \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(m+q-2h)^{2q-1}}{1^{2q|1}} + 2h \frac{(m+q-h-r-1)^{2q-1-1}}{1^{2q-1|1}} + h^2 \frac{(m+q-2r-2)^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1}} \right) \\ \vdots$$

Von den hier gefundenen Resultaten lassen sich leicht weitere Anwendungen machen. Wird die Anzahl der Elemente von r auf h in 1 beschränkt, also $r=h$ gesetzt, so liegt folgendes Problem vor

$$13) A = P'[sn; a_1, a_2, a_3, \dots a_h, b_2, b_3 \dots b_h, c_3, c_4, \dots c_h, \dots h_h]^q$$

Die Gruppen-Anzahl bestimmt sich aus 3 oder 7 leicht, wenn $r=h$ gesetzt wird. Sie läßt sich auch aus der Entwicklung des Polynoms

$$Q^q = (x+x^2+x^3+\dots+x^h+x^2+x^3\dots+x^h+x^3+x^4\dots+x^h+\dots+x^{h-1}+x^h+x^h)^q \\ = \frac{x^q}{(1-x)^{2q}} (1-[h+1]x^h+hx^{h+1})^q$$

ableiten, wenn die angezeigten Geschäfte ausgeführt und die Vorzahl von x^n bestimmt wird. Die wirkliche Entwicklung gibt folgende Darstellung

$$14) A = \frac{1}{1^{2q-1|1}} \left((n+q-1)^{2q-1|-1} - \frac{q}{1} [(h+1)(n+q-h-1)^{2q-1|-1} - h(n+q-h-2)^{2q-1|-1}] \right. \\ \left. + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} [(h+1)^2(n+q-2h-1)^{2q-1|-1} - 2(h+1)h(n+q-2h-2)^{2q-1|-1} + h^2(n+q-2h-3)^{2q-1|-1}] \right. \\ \left. - \frac{q^{3|-1}}{1^{3|1}} [(h+1)^3(n+q-3h-1)^{2q-1|-1} - 3(h+1)^2h(n+q-3h-2)^{2q-1|-1} + 3(h+1)h^2(n+q-3h-3)^{2q-1|-1} \dots] \right. \\ \left. \vdots \right) \\ = \frac{1}{1^{2q-1|1}} \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} (h+1)^y h^z (n+q-y(h+1)-zh-1)^{2q-x-1} \right)$$

Hiebei gelten die bekannten Bedingungsgleichungen. Das nämliche Resultat wäre entstanden, wenn $h=r$ in 3 gesetzt, die Horizontalreihen zusammengezogen und in veränderter Gestalt gegeben worden wären.

Aus 7 ergibt sich für dieselbe Gruppenanzahl, wenn $h=r$ gesetzt wird,

$$15) A = \frac{(n+q-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} - q \left(\frac{(n+q-h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + h \frac{(n+q-h-2)^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1}} \right) \\ + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(n+q-2h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + 2h \frac{(n+q-2h-2)^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1}} + h^2 \frac{(n+q-2h-3)^{2q-3|-1}}{1^{2q-3|1}} \right) \\ - \frac{q^{3|-1}}{1^{3|1}} \left(\frac{(n+q-3h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + 3h \frac{(n+q-3h-2)^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1}} + 3h^2 \frac{(n+q-3h-3)^{2q-3|-1}}{1^{2q-3|1}} \right) \\ \vdots \\ = \sum_{x=0}^x (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x}^{x=y+z} \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} h^z \frac{(n+q-yh-z[h+1]-1)^{2q-x|-1}}{1^{2q-x|1}} \right)$$

Hier gelten die bekannten Bedingungsgleichungen.

Soll der Inbegriff der Gruppen-Anzahlen für die Summen zwischen m und n also für $m+1$, $m+2$, $m+3$, ... n bestimmt werden, so ergibt sich aus 14 nach der in §. 4, Pg. 18 angezeigten Methode

$$16) \sum_{m+1}^n A = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x}^{x=y+z} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} (h+1)^{yh^z} \frac{(n+q-y[h+1]-zh)^{2q|-1}}{1^{2q|1}} \right) \\ - \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x}^{x=y+z} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} (h+1)^{yh^z} \frac{(m+q-y[h+1]-zh)^{2q|-1}}{1^{2q|1}} \right)$$

Aus der Darstellung 15 ergibt sich

$$17) \sum_{m+1}^n A = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x}^{x=y+z} \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} h^z \frac{(n+q-yh-z[h+1])^{2q-x|-1}}{1^{2q-x|1}} \right) \\ - \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x}^{x=y+z} \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} h^z \frac{(m+q-yh-z[h+1])^{2q-x|-1}}{1^{2q-x|1}} \right)$$

oder bei entwickelter Darstellung

$$18) \sum_{m+1}^n A = \frac{(n+q)^{2q|-1}}{1^{2q|1}} - q \left(\frac{(n+q-h)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + h \frac{(n+q-h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \\ + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(n+q-2h)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + 2h \frac{(n+q-2h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + h^2 \frac{(n+q-2h-2)^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1}} \right) \\ \vdots \\ - \frac{(m+q)^{2q|-1}}{1^{2q|1}} + q \left(\frac{(m+q-h)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + h \frac{(m+q-h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \\ - \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(m+q-2h)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + 2h \frac{(m+q-2h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + h^2 \frac{(m+q-2h-2)^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1}} \right) \\ \vdots$$

§. 8.
Das unter §. 7 Nro. 1 gegebene Problem läßt auch folgende Form zu

$$1) A_2 = P'[sn; a_1, a_2, a_3, \dots, a_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_r, \\ b_1, b_2, b_3, \dots, b_k, b_{k+1}, b_{k+2}, \dots, b_{r-1}, \\ c_1, c_2, c_3, \dots, c_k, c_{k+1}, c_{k+2}, \dots, c_{r-2}, \\ \vdots \\ h_1, h_2, h_3, \dots, h_k]^q$$

Zur Bestimmung der fraglichen Gruppenanzahl wird die Potenzierung des folgenden Polynomiums nöthig

$$Q^q = [x + x^2 + \dots x^r + x + x^2 + \dots x^{r-1} + x + x^2 + x^3 + \dots x^{r-2} \dots + x + x^2 + \dots x^k]^q \\ = \left(\frac{x - x^{r+1}}{1-x} + \frac{x - x^r}{1-x} + \frac{x - x^{r-1}}{1-x} + \dots + \frac{x - x^{k+1}}{1-x} \right)^q \\ = \left(hx - (x^{k+1} + x^{k+2} \dots x^{r+1}) \right)^q \frac{1}{(1-x)^q} \\ = \frac{x^q}{(1-x)^{2q}} \left(h - (hx + x^k - x^{r+1}) \right)^q$$

Die Geschäfte, deren Ausführung die entwickelte Darstellung gibt, lassen sich aus folgender Zusammenstellung erkennen.

$$Q^q = \left(x^q + \frac{(2q)^{2q-1-1}}{1^{2q-1-1}} x^{q+1} + \frac{(2q+1)^{2q-1-1}}{1^{2q-1-1}} x^{q+2} + \dots \right) (h^q - qh^{q-1}(hx + x^k - x^{r+1}) \\ + \frac{q^{2-1}}{1^{2-1}} h^{q-2} (hx + x^k - x^{r+1})^2 \\ - \frac{q^{3-1}}{1^{3-1}} h^{q-3} (hx + x^k - x^{r+1})^3 \\ + \frac{q^{4-1}}{1^{4-1}} h^{q-4} (hx + x^k - x^{r+1})^4 \\ \vdots \vdots \vdots)$$

Ist die Entwicklung gemacht, so muß die Form der Vorzahl von x^n bestimmt werden, um das unter 1 vorgelegte Problem zu beantworten. Die Form dieser Vorzahl ist

Die Ausführung der hier angedeuteten Geschäfte gibt die Vorzahl von x'' , deren Gestalt aus folgender Gleichung ersichtlich ist

$$3) A_2 = (-)^q \frac{1}{1^{2q-1,1}} \left((n+q-kq-1)^{2q-1,1} - q \left((n+q-k[q-1]-r-2)^{2q-1,1} + h \left| (n+q-k[q-1]-1)^{2q-1,1} \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. - (n+q-k[q-1]-2)^{2q-1,1} \right) \right. \right. \\ \left. + \frac{q^{2,1-1}}{1^{2,1}} \left((n+q-k[q-2]-2r-3)^{2q-1,1} + 2h \left| (n+q-k[q-2]-r-2)^{2q-1,1} + h^2 \left| (n+q-k[q-2]-1)^{2q-1,1} \right. \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. - (n+q-k[q-2]-r-3)^{2q-1,1} \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. - 2 \left((n+q-k[q-2]-2)^{2q-1,1} \right. \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. + (n+q-k[q-2]-3)^{2q-1,1} \right) \right) \right) \\ \vdots \\ = (-)^q \left(\sum_{x=0}^{x=1} (-)^x \frac{q^{1,1-1}}{1^{x,1}} \left(\sum_{x=w+y+z}^{x=w+y+z} (-)^x \frac{(w+y+z)^{w+y+z+1,1}}{1^{w,1} 1^{y,1} 1^{z,1}} h^z \frac{(n+q-k[q-x]-w[r+1]-y[0-z.1-1])^{2q-1,1}}{1^{2q-1,1}} \right) \right)$$

Die Bedingungsgleichung für das zweite Σ ist

$$x = w + y + z$$

w bezieht sich hier auf $r+1$, y auf 0 und z auf 1. Die übrigen Bedingungen, welchen diese Größen unterliegen, sind bekannt.

Die Fakultäten, in dieser entwickelten Darstellung bilden der Reihe nach die ersten, zweiten, dritten Unterschiede u. s. w. Wendet man auf sie die Gleichung 6 §. 7, Pg. 31 an, so ergibt sich folgende Darstellung für Nro. 3.

$$4) A_2 = (-)^q \left(\left(\frac{(n+q-kq-1)^{2q-1,1}}{1^{2q-1,1}} - q \left(\frac{(n+q-k[q-1]-r-2)^{2q-1,1}}{1^{2q-1,1}} + h \frac{(n+q-k[q-1]-2)^{2q-2,1-1}}{1^{2q-2,1}} \right) \right. \right. \\ \left. + \frac{q^{2,1-1}}{1^{2,1}} \left(\frac{(n+q-k[q-2]-2r-3)^{2q-1,1}}{1^{2q-1,1}} + 2h \frac{(n+q-k[q-2]-r-3)^{2q-2,1-1}}{1^{2q-2,1}} + h^2 \frac{(n+q-k[q-2]-3)^{2q-3,1-1}}{1^{2q-3,1}} \right) \right. \\ \left. \vdots \right) \\ = (-)^q \left(\sum_{x=0}^{x=1} (-)^x \frac{q^{x,1-1}}{1^{x,1}} \left(\sum_{x=y+z}^{x=y+z} \frac{(y+z)^{y+z+1,1}}{1^{y,1} 1^{z,1}} h^z \frac{(n+q-k[q-x]-y[r+1]-z.1-1)^{2q-x-1,1}}{1^{2q-x-1,1}} \right) \right)$$

y bezieht sich hier auf $r+1$ und z auf 1. Für die GröÙe $x=y+z$ innerhalb der Fakultät nach dem zweiten Σ ist immer der Werth von x unverändert beizubehalten.

Wird die Ordnung in den GrundgröÙen des Polynomiums, woraus die Gleichung 3 abgeleitet wurde

$$(-)^q [x^k - x^{r+1} + h(1-x)]^q$$

beibehalten, aber die Glieder der entwickelten Darstellung in der umgekehrten Ordnung genommen, so entsteht folgendes

$$(x^{r+1} + h[1-x])^q - qx^k(x^{r+1} + h[1-x])^{q-1} + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} x^{2k}(x^{r+1} + h[1-x])^{q-2} \dots$$

Werden nun die nöthigen Entwicklungen gemacht, und die Unterschiede der Fakultäten, worauf diese führen, beachtet, so ergibt sich folgende Darstellung

$$\begin{aligned} 5) A_2 = & \frac{1}{1^{2q-1|1}} \left(h^q \Delta^q (n-1)^{2q-1|1} - \frac{q}{1} h^{q-1} \left(\Delta^{q-1} (n-k)^{2q-1|1} - \Delta^{q-1} (n-r-1)^{2q-1|1} \right) \right. \\ & + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} h^{q-2} \left(\Delta^{q-2} (n-2k+1)^{2q-1|1} - 2\Delta^{q-2} (n-k-r)^{2q-1|1} + \Delta^{q-2} (n-2r-1)^{2q-1|1} \right) \\ & - \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} h^{q-3} \left(\Delta^{q-3} (n-3k+2)^{2q-1|1} - 3\Delta^{q-3} (n-2k-r+1)^{2q-1|1} + 3\Delta^{q-3} (n-k-2r)^{2q-1|1} \dots \right) \\ & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \end{aligned}$$

Wird die Gleichung 6 §. 7, Pg. 31 benützt, um die Unterschiede auf einfachere Darstellungen zurückzuführen, so ergibt sich

$$\begin{aligned} 6) A_2 = & h^q \frac{(n-1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} - \frac{q}{1} h^{q-1} \left(\frac{(n-k)^{q-1|1}}{1^{q|1}} - \frac{(n-r-1)^{q-1|1}}{1^{q|1}} \right) \\ & + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} h^{q-2} \left(\frac{(n+2k+1)^{q+1|1}}{1^{q+1|1}} - 2 \frac{(n-k-r)^{q+1|1}}{1^{q+1|1}} + \frac{(n-2r-1)^{q+1|1}}{1^{q+1|1}} \right) \\ & - \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} h^{q-3} \left(\frac{(n-3k+2)^{q+2|1}}{1^{q+2|1}} - 3 \frac{(n-3k-r+1)^{q+2|1}}{1^{q+2|1}} + \frac{3 \cdot 2 (n-k-2r)^{q+2|1}}{1 \cdot 2 \cdot 1^{q+2|1}} - \dots \right) \\ & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ = & \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{y+z=x} (-)^y \frac{(y+z)^{y+z|1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(n-y[k+1]-zr-1)^{q+y+z-1|1}}{1^{q+y+z-1|1}} \right) \end{aligned}$$

Soll der Inbegriff der Gruppenanzahlen der Summen $m+1$, $m+2$, $m+3$, $\dots$ n bestimmt werden, so erhält man diesen durch Anwendung des früher angegebenen Verfahrens leicht. Es ist

$$\sum_{m+1}^n A_2 = \sum_{n=q}^n A_2 - \sum_{n=q}^m A_2$$

Aus der Gleichung 6 ergibt sich sofort

$$7) \sum_{m+1}^n A_2 = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|l-1}}{1^{x|l}} h^{q-x} \left(\sum_{x=y+z}^{x=y+z} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|l-1}}{1^{y|l} 1^{z|l}} \frac{(n-y[k+1]-zr)^{q+y+z|l-1}}{1^{q+y+z|l}} \right) - \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|l-1}}{1^{x|l}} h^{q-x} \left(\sum_{x=y+z}^{x=y+z} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|l-1}}{1^{y|l} 1^{z|l}} \frac{(m-y[k+1]-zr)^{q+y+z|l-1}}{1^{q+y+z|l}} \right)$$

Wird hierin $m=q-1$ gesetzt, so ergibt sich der Inbegriff der Summen von q bis n . Der zweite Ausdruck in 7 verschwindet. Die entwickelte Darstellung für 7 ist folgende

$$8) \sum_{m+1}^n A_2 = h^q \frac{n^{q|l-1}}{1^{q|l}} - qh^{q-1} \left(\frac{(n-k+1)^{q+1|l-1}}{1^{q+1|l}} - \frac{(n-r)^{q+1|l-1}}{1^{q+1|l}} \right) + \frac{q^{2|l-1}}{1^{2|l}} h^{q-2} \left(\frac{(n-2k+2)^{q+2|l-1}}{1^{q+2|l}} - 2 \frac{(n-k-r+1)^{q+2|l-1}}{1^{q+2|l}} + \frac{(n-2r)^{q+2|l-1}}{1^{q+2|l}} \right) - h^q \frac{m^{q|l-1}}{1^{q|l}} + \frac{q}{1} h^{q-1} \left(\frac{(m-k+1)^{q+1|l-1}}{1^{q+1|l}} - \frac{(m-r)^{q+1|l-1}}{1^{q+1|l}} \right) - \frac{q^{2|l-1}}{1^{2|l}} h^{q-2} \left(\frac{(m-2k+2)^{q+2|l-1}}{1^{q+2|l}} - 2 \frac{(m-k-r+2)^{q+2|l-1}}{1^{q+2|l}} + \frac{(m-2r)^{q+2|l-1}}{1^{q+2|l}} \right)$$

Werden die Elementen-Reihen in dem Probleme 1 um $(k-1)$ Glieder verkürzt, so geht r in h über und es liegt folgende Aufgabe vor

$$9) A = P'[sn; \begin{matrix} a_1, & a_2, & a_3, & \dots & a_n \\ b_1, & b_2, & b_3, & \dots & b_{n-1} \\ c_1, & c_2, & c_3, & \dots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_1, & g_2 & & & \\ h_1 & & & & \end{matrix}]^q$$

Um dieses Problem zu lösen, wird folgendes Polynomium zu entwickeln seyn.

$$\begin{aligned}
 Q^q &= (x + x^2 + x^3 + \dots + x^h + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{h-1} + x + x^2 + \dots + x^{h-2} + \dots + x + x^2 + x)^q \\
 &= \left(\frac{hx - (x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^{h+1})}{1-x} \right)^q = \left(\frac{hx - hx^2 - x^2 + x^{h+2}}{(1-x)^2} \right)^q \\
 &= \frac{x^q}{(1-x)^{2q}} [h - (h+1)x + x^{h+1}]^q \\
 &= \left(x^q + \frac{(2q)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} x^{q+1} + \frac{(2q+1)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} x^{q+2} + \dots \right) \left(h^q - qh^{q-1}([h+1]x - x^{h+1}) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} h^{q-2}([h+1]x - x^{h+1})^2 \right. \\
 &\quad \left. - \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} h^{q-3}([h+1]x - x^{h+1})^3 \right. \\
 &\quad \left. \vdots \right)
 \end{aligned}$$

Werden die nöthigen Entwicklungen gemacht, so ergibt sich für die Vorzahl von x^n folgende Darstellung

$$\begin{aligned}
 10) A &= \frac{1}{1^{2q-1|1}} \left(h^q (n+q-1)^{2q-1|1} - qh^{q-1}[(h+1)(n+q-2)^{2q-1|1} - (n+q-h-2)^{2q-1|1}] \right. \\
 &\quad \left. + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} h^{q-2}[(h+1)^2(n+q-3)^{2q-1|1} - 2(h+1)(n+q-h-3)^{2q-1|1} + (n+q-2h-3)^{2q-1|1}] \right. \\
 &\quad \left. - \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} h^{q-3}[(h+1)^3(n+q-4)^{2q-1|1} - 3(h+1)^2(n+q-h-4)^{2q-1|1} + 3(h+1)(n+q-2h-4)^{2q-1|1} - \dots] \right. \\
 &\quad \left. \vdots \right)
 \end{aligned}$$

oder

$$11) A = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{y+z=x} (h+1)^y (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(n+q-y-1-z[h+1]-1)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} \right)$$

Das in 9 aufgeführte Problem löst sich auch dadurch, daß in den Gleichungen 2, 3, 4 und 6 $k=1$ und $r=h$ gesetzt wird. Die eben gefundene Gleichung ergibt sich aus 10, wenn die Horizontal-Reihen gehörig vereinigt werden.

Aus der Gleichung 4 ergibt sich

$$\begin{aligned}
 12) A &= (-)^q \left(\frac{(n-1)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} - q \left(\frac{(n-h-1)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} + \frac{h(n-1)^{2q-2|1}}{1^{2q-2|1}} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(n-2h-1)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} + 2h \frac{(n-h-1)^{2q-2|1}}{1^{2q-2|1}} + h^2 \frac{(n-1)^{2q-3|1}}{1^{2q-3|1}} \right) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} \left(\frac{(n-3h-1)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} + 3h \frac{(n-2h-1)^{2q-2|1}}{1^{2q-2|1}} + 3h^2 \frac{(n-h-1)^{2q-3|1}}{1^{2q-3|1}} + h^3 \frac{(n-1)^{2q-4|1}}{1^{2q-4|1}} \right) \right. \\
 &\quad \left. \vdots \right) \\
 &= (-)^q \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x} \frac{(y+z)^{y+z|1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} h^z \frac{(n-yh-z \cdot 0-1)^{2q-z-1|1}}{1^{2q-z-1|1}} \right)
 \end{aligned}$$

Hierin bezieht sich x auf h und z auf 0 .

Aus der Gleichung 6 ergibt sich

$$\begin{aligned}
 13) \quad A &= h^q \frac{(n-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|1}} - qh^{q-1} \left(\frac{(n-1)^{q|-1}}{1^{q|1}} - \frac{(n-h-1)^{q|-1}}{1^{q|1}} \right) \\
 &+ \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} h^{q-2} \left(\frac{(n-1)^{q+1|-1}}{1^{q+1|1}} - 2 \frac{(n-h-1)^{q+1|-1}}{1^{q+1|1}} + \frac{(n-2h-1)^{q+1|-1}}{1^{q+1|1}} \right) \\
 &- \frac{q^{3|-1}}{1^{3|1}} h^{q-3} \left(\frac{(n-1)^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} - 3 \frac{(n-h-1)^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} + 3 \frac{(n-2h-1)^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} - \frac{(n-3h-1)^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} \right) \\
 &\vdots \\
 &= \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{x=y+z} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(n-y \cdot 0 - zh-1)^{q+y+z-1|-1}}{1^{q+y+z-1|1}} \right)
 \end{aligned}$$

y bezieht sich hierin auf 0 und z auf h .

Soll der Inbegriff der Gruppenanzahlen der Summen $m+1, m+2, m+3 \dots n$ genommen werden, so ist auch hier, wie früher, zu verfahren. Aus 12 ist

$$\begin{aligned}
 14) \quad \sum_{m+1}^n A &= (-)^q \left(\frac{n^{2q|-1}}{1^{2q|1}} - q \left(\frac{(n-h)^{2q|-1}}{1^{2q|1}} + h \frac{n^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(n-2h)^{2q|-1}}{1^{2q|1}} + 2h \frac{(n-h)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + h^2 \frac{n^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1}} \right) \right. \\
 &\quad \left. \vdots \right) \\
 &= (-)^{q+1} \left(\frac{m^{2q|-1}}{1^{2q|1}} - q \left(\frac{(m-h)^{2q|-1}}{1^{2q|1}} + h \frac{m^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(m-2h)^{2q|-1}}{1^{2q|1}} + 2h \frac{(m-h)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + h^2 \frac{m^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1}} \right) \right. \\
 &\quad \left. \vdots \right) \\
 &= (-)^q \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{x=y+z} \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} h^z \frac{(n-yh-z \cdot 0)^{2q-x-1|-1}}{1^{2q-x-1|1}} \right) \\
 &\quad (-)^{q+1} \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{x=y+z} \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} h^z \frac{(m-yh-z \cdot 0)^{2q-x-1|-1}}{1^{2q-x-1|1}} \right)
 \end{aligned}$$

Aus 10 ergibt sich

$$\begin{aligned}
 15) \quad \sum_{m+1}^n A &= \\
 &\sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{x=y+z} (h+1)^y (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(n+q-y \cdot 1 - z[h+1])^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \\
 &- \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{x=y+z} (h+1)^y (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(m+q-y \cdot 1 - z[h+1])^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right)
 \end{aligned}$$

Aus 13 ergibt sich

$$\begin{aligned}
 16) \sum_{m+1}^n A &= h^q \frac{n^{q|-1}}{1^{q|1}} - qh^{q-1} \left(\frac{n^{q+1|-1}}{1^{q+1|1}} - \frac{(n-h)^{q+1|-1}}{1^{q+1|1}} \right) \\
 &+ \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} h^{q-2} \left(\frac{n^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} - 2 \frac{(n-h)^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} + \frac{(n-2h)^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} \right) \\
 &\vdots \\
 &- h^q \frac{m^{q|-1}}{1^{q|1}} + \frac{q}{1} h^{q-1} \left(\frac{m^{q+1|-1}}{1^{q+1|1}} - \frac{(m-h)^{q+1|-1}}{1^{q+1|1}} \right) \\
 &- \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} h^{q-2} \left(\frac{m^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} - 2 \frac{(m-h)^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} + \frac{(m-2h)^{q+2|-1}}{1^{q+2|1}} \right) \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned}
 17) \sum_{m+1}^n A &= \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{y+z=x} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(n-y \cdot 0 - zh)^{q+y+z|-1}}{1^{q+y+z|1}} \right) \\
 &- \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{y+z=x} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(m-y \cdot 0 - zh)^{q+y+z|-1}}{1^{q+y+z|1}} \right)
 \end{aligned}$$

§. 9.

Es sind h Elementenreihen gegeben, von denen die erste $(2h-1)$ Elemente zählt, die zweite zwei Elemente weniger als die erste, die dritte zwei weniger als die zweite, u. s. w., die letzte nur ein Element. Aus den Elementen dieser Reihe werden die Versetzungen mit Wiederholungen zur Summe n in der q^{ten} Classe gebildet. Wie groß ist die Gruppenanzahl?

Dieses Problem stellt sich unter folgender Form dar.

$$\begin{aligned}
 1) A &= P' [sn; a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{2h-4}, a_{2h-3}, a_{2h-2}, a_{2h-1}]^q \\
 &\quad b_2, b_3, b_4, \dots, b_{2h-4}, b_{2h-3}, b_{2h-2}, \\
 &\quad c_3, c_4, \dots, c_{2h-4}, c_{2h-3} \\
 &\quad d_4, \dots, d_{2h-4} \\
 &\quad \vdots \\
 &\quad g_{h-1}, g_h, g_{h+1} \\
 &\quad h_h
 \end{aligned}$$

Werden für diese Elementenreihen Polynomien eingeführt, so entsteht

$$\begin{aligned}
 Q^h &= [x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots + (h-1)x^{h-1} + hx^h + (h-1)x^{h+1} + \dots + 3x^{2h-2} + 2x^{2h-1} + x^{2h}]^q \\
 &= \left(\frac{x-x^{2h}}{1-x} + \frac{x^2-x^{2h-1}}{1-x} + \frac{x^3-x^{2h-2}}{1-x} + \dots + \frac{x^h-x^{h+1}}{1-x} \right) \\
 &= \left(\frac{x + x^2 + x^3 + \dots + x^h - (x^{h+1} + x^{h+2} + x^{h+3} + \dots + x^{2h})}{1-x} \right) q \\
 &= \frac{x^q}{(1-x)^q} \left(\frac{1-2h^h+x^{2h}}{1-x} \right) q = \left(1 - (2x^h - x^{2h}) \right) \frac{x^q}{(1-x)^q} \\
 &= \left(x^q + \frac{(2q)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} x^{q+1} + \frac{(2q+1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} x^{q+2} + \frac{(2q+2)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} x^{q+3} + \dots \right) \left(1 - q(2x^h - x^{2h}) \right) \\
 &\quad + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} (2x^h - x^{2h})^2 \\
 &\quad - \frac{q^{3|-1}}{1^{3|1}} (2x^h - x^{2h})^3 \\
 &\quad \vdots
 \end{aligned}$$

Werden die angezeigten Entwicklungen gemacht, und wird dann die Vorzahl von x^n bestimmt, so ergibt sich zur Bestimmung der fraglichen Gruppenanzahl folgende Darstellung

$$\begin{aligned}
 2) A &= \frac{1}{1^{2q-1|1}} \left((n+q-1)^{2q-1|-1} - q[2(n+q-h-1)^{2q-1|-1} - (n+q-2h-1)^{2q-1|-1}] \right. \\
 &\quad + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} [2^2(n+q-2h-1)^{2q-1|-1} - 2 \cdot 2(n+q-3h-1)^{2q-1|-1} + (n+q-4h-1)^{2q-1|-1}] \\
 &\quad - \frac{q^{3|-1}}{1^{3|1}} [2^3(n+q-3h-1)^{2q-1|-1} - 3 \cdot 2^2(n+q-4h-1)^{2q-1|-1} + 3 \cdot 2(n+q-5h-1)^{2q-1|-1} - \dots] \\
 &\quad \vdots \\
 &= \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y=0}^{y=x} (-)^y \frac{(y+z)^{y+x|-1}}{1^{y|1} 1^{x|1}} 2^y \frac{(n+q-yh-z2h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right)
 \end{aligned}$$

Wird die Darstellung 2 anders geordnet, so ergibt sich folgende

$$\begin{aligned}
 3) A &= \frac{(n+q-1)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} - 2q \frac{(n+q-1-h)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \\
 &\quad + \left(2^2 \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} + q \right) \frac{(n+q-2h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \\
 &\quad - \left(2^3 \frac{q^{3|-1}}{1^{3|1}} + 2 \cdot 2 \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \right) \frac{(n+q-3h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \\
 &\quad \vdots \\
 &\quad (-)^{2r} \left(2^{2r} \frac{q^{2r|-1}}{1^{2r|1}} + \frac{(2r-1)}{1} 2^{2r-2} \frac{q^{2r-1|-1}}{1^{2r-1|1}} + \frac{(2r-2)^{2-1}}{1^{2|1}} 2^{2r-4} \frac{q^{2r-2|-1}}{1^{2r-2|1}} \dots \frac{r^{r|-1}}{1^{r|1}} q^{r|-1} \right) \frac{(n+q-2rh-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \\
 &\quad (-)^{2r+1} \left(2^{2r+1} \frac{q^{2r+1|-1}}{1^{2r+1|1}} + \frac{2r}{1} 2^{2r-1} \frac{q^{2r|-1}}{1^{2r|1}} + \dots \frac{(r+1)^{r|-1}}{1^{r|1}} 2^{q^{r+1|-1}} \right) \frac{(n+q-[2r+1]h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \\
 &\quad \vdots
 \end{aligned}$$

Nun ergibt sich durch eine ganz einfache Entwicklung

$$2^1 \frac{q^{1|-1}}{1^{1|1}} + q = \frac{2q(2q-1)}{1 \cdot 2}$$

$$2^3 \frac{q^{3|-1}}{1^{3|1}} + 2 \cdot 2 \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} = \frac{2q(2q-1)(2q-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

$$2^4 \frac{q^{4|-1}}{1^{4|1}} + 3 \cdot 2^2 \frac{q^{3|-1}}{1^{3|1}} + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} = \frac{2q(2q-1)(2q-2)(2q-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$$

u. s. w. Hiernach gehen die Gleichungen 2 und 3 in folgende über

$$4) \Lambda = \frac{(n+q-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} - 2q \frac{(n+q-h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} + \frac{(2q)^{2|-1}}{1^{2|1}} \frac{(n+q-2h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} - \dots$$

$$= \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{(2q)^{x|-1}}{1^{x|1}} \frac{(n+q-xh-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}}$$

Soll der Inbegriff der Summen zwischen m und n genommen werden, so ist

$$\sum_{m+1}^n \Lambda = \sum_{n=q}^{n=n} \Lambda - \sum_{n=q}^{n=m} \Lambda$$

Werden die Geschäfte ausgeführt, so ergibt sich aus 2

$$5) \sum_{m+1}^n \Lambda = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} 2^y \frac{(n+q-yh-z \cdot 2h)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right)$$

$$- \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y+z=x} (-)^z \frac{(y+z)^{y+z|-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} 2^y \frac{(m+q-yh-z \cdot 2h)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right)$$

Aus 4 aber ergibt sich

$$6) \sum_{m+1}^n \Lambda = \frac{1}{1^{2q-1|1}} \left((n+q)^{2q-1|-1} - (m+q)^{2q-1|-1} \right)$$

$$- \frac{2q}{1} \left((n+q-h)^{2q-1|-1} - (m+q-h)^{2q-1|-1} \right)$$

$$+ \frac{(2q)^{2|-1}}{1^{2|1}} \left((n+q-2h)^{2q-1|-1} - (m+q-2h)^{2q-1|-1} \right)$$

$$- \frac{(2q)^{3|-1}}{1^{3|1}} \left((n+q-3h)^{2q-1|-1} - (m+q-3h)^{2q-1|-1} \right)$$

$$\vdots$$

$$= \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{(2q)^{x|-1}}{1^{x|1}} \frac{(n+q-xh)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} - \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{(2q)^{x|-1}}{1^{x|1}} \frac{(m+q-xh)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}}$$

Durch die vorstehende Aufgabe ist zugleich auch folgende gelöst.

$$A = P' [sn; a_{-h+1}, a_{-h+2}, a_{-h+3}, \dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots, a_{h-2}, a_{h-1}, a_{h-1}]$$

$$b_{-h+2}, b_{-h+3}, \dots, b_{-1}, b_0, b_1, \dots, b_{h-2}, b_{h-2}$$

$$c_{-h+3}, \dots, c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_{h-2}$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$g_{-1}, g_0, g_1$$

$$h_0$$

Hierin können sich die Summen von $-q(h-1)$ bis zu $+q(h-1)$ erstrecken. Die Summe des Mittelgliedes geht in 0 über und scheidet die positiven Summen von den negativen. Die Gruppenanzahl für n wird gefunden, wenn man $n+hq$ statt n in 4 setzt. Es entsteht

$$7) A = \frac{(n+(h+1)q-1)^{2q-1-1}}{1^{2q-1|1}} - 2q \frac{(n+(h+1)q-h-1)^{2q-1-1}}{1^{2q-1|1}} + \frac{(2q)^{2|1-1}}{1^{2|1}} \frac{(n+(h+1)q-2h-1)^{2q-1-1}}{1^{2q-1|1}} - \dots$$

Aus 6 wird

$$8) \sum_{m+1}^n A = \frac{1}{1^{2q|1}} \left((n+(h+1)q)^{2q|1-1} - (m+(h+1)q)^{2q|1-1} \right.$$

$$- 2q \left((n+(h+1)q-h)^{2q|1-1} - (m+(h+1)q-h)^{2q|1-1} \right)$$

$$+ \frac{(2q)^{2|1-1}}{1^{2|1}} \left((n+(h+1)q-2h)^{2q|1-1} - (m+(h+1)q-2h)^{2q|1-1} \right)$$

$$\vdots$$

$$\left. \vdots \right)$$

m und n können hier einen positiven oder negativen Werth haben. Sind die beiden Summen vom Mittelgliede gleich weit entfernt, so ist

$$9) \sum_{-n}^{+n} A = \frac{1}{1^{2q|1}} \left((n+(h+1)q)^{2q|1-1} - (-n+(h+1)q)^{2q|1-1} \right.$$

$$- 2q \left((n+(h+1)q-h)^{2q|1-1} - (-n+(h+1)q-h)^{2q|1-1} \right)$$

$$+ \frac{(2q)^{2|1-1}}{1^{2|1}} \left((n+(h+1)q-2h)^{2q|1-1} - (-n+(h+1)q-2h)^{2q|1-1} \right)$$

$$\vdots$$

$$\left. \vdots \right)$$

Es sind h Elementenreihen gegeben, von denen die h^{te} $(k+1)$ Glieder, jede vorhergehende immer zwei mehr als die nachfolgende zählt. Aus den Elementen dieser Reihen werden die Versetzungen mit Wiederholungen zur Summe n in der q^{ten} Classe gebildet. Wie groß ist ihre Gruppenanzahl?

Dieses Problem stellt sich unter folgender Gestalt dar

$$10) A = P'[sn; a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{2h+k-2}, a_{2h+k-1}]^q$$

$$\begin{matrix} b_2, b_3, b_4, & \dots & b_{2h+k-2} \\ c_3, c_4, & \dots & c_{2h+k-3} \\ d_4, & \dots & d_{2h+k-4} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{h-1}, g_h, g_{h+1}, \dots, g_{h+k+1} \\ h_h, h_{h+1}, h_{h+2}, \dots, h_{h+k} \end{matrix}$$

Werden für diese Reihen Polynomien eingeführt, so entsteht

$$Q^q = [x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^{2h+k-1}]^q$$

$$\begin{matrix} x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^{2h+k-2} \\ x^3 + x^4 + \dots + x^{2h+k-3} \\ \vdots \\ x^{h-1} + x^h + x^{h+1} + \dots + x^{h+k} + x^{h+k+1} \\ x^h + x^{h+1} + \dots + x^{h+k} \end{matrix}$$

$$= \left(\frac{x - x^{2h+k}}{1-x} + \frac{x^2 - x^{2h+k-1}}{1-x} + \dots + \frac{x^h - x^{h+k+1}}{1-x} \right)^q = \left(\frac{x - x^{h+1}}{(1-x)^2} - \frac{x^{h+k+1} - x^{2h+k+1}}{(1-x)^2} \right)^q$$

$$= \frac{x^q}{(1-x)^{2q}} \left(1 - (x^h + x^{h+k} - x^{2h+k}) \right)^q$$

$$= \left(x^q + \frac{(2q)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|-1}} x^{q+1} + \frac{(2q+1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|-1}} x^{q+2} + \dots \right) \left(1 - q(x^h + x^{h+k} - x^{2h+k}) \right.$$

$$\left. + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} (x^h + x^{h+k} - x^{2h+k})^2 - \frac{q^{3|-1}}{1^{3|-1}} (x^h + x^{h+k} - x^{2h+k})^3 \right.$$

$$\left. \vdots \right)$$

Werden die angezeigten Geschäfte ausgeführt, und wird dann die Vorzahl von x^n bestimmt, so ergibt sich für die fragliche Gruppenanzahl folgende Darstellung

$$\begin{aligned}
 11) \quad A = & \frac{1}{1^{2q-1|1}} \left((n+q-1)^{2q-1|-1} - q \left((n+q-h-1)^{2q-1|-1} + (n+q-h-k-1)^{2q-1|-1} \right. \right. \\
 & \left. \left. - (n+q-2h-k-1)^{2q-1|-1} \right) \right. \\
 & + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left((n+q-2h-1)^{2q-1|-1} + 2 \left((n+q-2h-k-1)^{2q-1|-1} + (n+q-2h-2k-1)^{2q-1|-1} \right. \right. \\
 & \left. \left. - (n+q-3h-k-1)^{2q-1|-1} - 2(n+q-3h-2k-1)^{2q-1|-1} \right) \right. \\
 & \left. - \frac{q^{3|-1}}{1^{3|1}} \left((n+q-3h-1)^{2q-1|-1} + 3 \left((n+q-3h-k-1)^{2q-1|-1} + 3 \left((n+q-3h-2k-1)^{2q-1|-1} \right. \right. \right. \right. \\
 & \left. \left. \left. - (n+q-4h-k-1)^{2q-1|-1} - 2(n+q-4h-2k-1)^{2q-1|-1} \right) \right. \right. \\
 & \left. \left. \left. (n+q-5h-2k-1)^{2q-1|-1} \dots \right) \right. \right. \\
 & \left. \left. \left. \vdots \right) \right. \right. \\
 & \left. \left. \left. \vdots \right) \right. \right. \\
 = & \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{x=w+y+z}^{x=w+y+z} (-)^z \frac{(w+y+z)^{w+y+z|-1}}{1^{w|1} 1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(n+q-wh-y[h+k]-z[2h+k]-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right)
 \end{aligned}$$

In dieser Darstellung gelten die bekannten Bedingungsgleichungen.
Soll der Inbegriff der Gruppenanzahlen für die Summen $m+1$,
 $m+2$, $m+3$, ... n bestimmt werden, so ergibt sich aus 11 nach
dem bekannten Verfahren

$$\begin{aligned}
 12) \quad \sum_{m+1}^n = & \frac{1}{1^{2q|1}} \left((n+q)^{2q|-1} - q \left((n+q-h)^{2q|-1} + (n+q-h-k)^{2q|-1} \right. \right. \\
 & \left. \left. - (n+q-2h-k)^{2q|-1} \right) \right. \\
 & + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left((n+q-2h)^{2q|-1} + 2 \left((n+q-2h-k)^{2q|-1} + (n+q-2h-2k)^{2q|-1} \right. \right. \\
 & \left. \left. - (n+q-3h-k)^{2q|-1} - 2(n+q-3h-2k)^{2q|-1} \right) \right. \\
 & \left. \left. + (n+q-4h-2k)^{2q|-1} \right) \right. \\
 & \left. \left. \vdots \right) \right. \\
 & - \frac{1}{1^{2q|1}} \left((m+q)^{2q|-1} - q \left((m+q-h)^{2q|-1} + (m+q-h-k)^{2q|-1} \right. \right. \\
 & \left. \left. - (m+q-2h-k)^{2q|-1} \right) \right. \\
 & + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left((m+q-2h)^{2q|-1} + 2 \left((m+q-2h-k)^{2q|-1} + (m+q-2h-2k)^{2q|-1} \right. \right. \\
 & \left. \left. - (m+q-3h-k)^{2q|-1} - 2(m+q-3h-2k)^{2q|-1} \right) \right. \\
 & \left. \left. + (m+q-4h-2k)^{2q|-1} \right) \right. \\
 & \left. \left. \vdots \right) \right.
 \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned}
 13) \quad \sum_{m+1}^n A = & \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{x=w+y+z}^{x=w+y+z} (-)^z \frac{(w+y+z)^{w+y+z|-1}}{1^{w|1} 1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(n+q-wh-y[h+k]-z[2h+k])^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right) \\
 & - \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{x=w+y+z}^{x=w+y+z} (-)^z \frac{(w+y+z)^{w+y+z|-1}}{1^{w|1} 1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(m+q-wh-y[h+k]-z[2h+k])^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1}} \right)
 \end{aligned}$$

Die Gleichungen 10—13 sind, wie sich leicht erkennen läßt allgemeiner als die in 2—9 aufgefundenen. Wird $k=0$, so lassen sich die ersten aus den letztern ableiten.

§. 10

Es sind h Elementen-Reihen gegeben, deren Gliederanzahlen ganz willkürlich beschränkt sind, die erste Reihe hat r_1-p_1 , die zweite r_2-p_2 , die dritte r_3-p_3 Elemente u. s. w. Aus den Elementen dieser Reihen werden die Versetzungen mit Wiederholungen zur Summe n in der q^{ten} Classe gebildet. Wie groß ist ihre Gruppenanzahl?

Das Problem stellt sich unter folgender Gestalt dar

$$1) \quad A = P' [sn; a_{p_1+1}, a_{p_1+2}, a_{p_1+3}, \dots, a_{r_1-1}, a_{r_1} \\ b_{p_2+1}, b_{p_2+2}, b_{p_2+3}, \dots, b_{r_2-1}, b_{r_2} \\ c_{p_3+1}, c_{p_3+2}, c_{p_3+3}, \dots, c_{r_3-1}, c_{r_3} \\ \vdots \\ h_{p_h+1}, h_{p_h+2}, h_{p_h+3}, \dots, h_{r_h-1}, h_{r_h}]^q$$

Es kann auch unter folgender Form dargestellt werden

$$2) \quad A = P' [sn; a_{p_1+1}, a_{p_1+2}, a_{p_1+3}, \dots, a_{r_1} \\ a_{p_2+1}, a_{p_2+2}, a_{p_2+3}, \dots, a_{r_2} \\ a_{p_3+1}, a_{p_3+2}, a_{p_3+3}, \dots, a_{r_3} \\ \vdots \\ a_{p_h+1}, a_{p_h+2}, a_{p_h+3}, \dots, a_{r_h}]^q$$

Werden für diese Elementen-Reihen Polynomien eingeführt, so entsteht

$$\begin{aligned}
 Q^q &= [X^{p_1+1} + X^{p_1+2} + X^{p_1+3} + \dots + X^{r_1} \\
 &\quad X^{p_2+1} + X^{p_2+2} + X^{p_2+3} + \dots + X^{r_2} \\
 &\quad X^{p_3+1} + X^{p_3+2} + X^{p_3+3} + \dots + X^{r_3} \\
 &\quad \vdots \\
 &\quad X^{p_h+1} + X^{p_h+2} + X^{p_h+3} + \dots + X^{r_h}]^q \\
 &= \left(\frac{X^{p_1+1} - X^{r_1+1}}{1-x} + \frac{X^{p_2+1} - X^{r_2+1}}{1-x} + \frac{X^{p_3+1} - X^{r_3+1}}{1-x} + \dots + \frac{X^{p_h+1} - X^{r_h+1}}{1-x} \right)^q \\
 &= \frac{x^q}{(1-x)^q} (X^{p_1} - X^{r_1} + X^{p_2} - X^{r_2} + X^{p_3} - X^{r_3} + \dots + X^{p_h} - X^{r_h})^q \\
 &= \frac{1}{1^{q-1|1}} (x^q + q^{q-1|1} x^{q+1} + [q+1]^{q-1|1} x^{q+2} + [q+2]^{q-1|1} x^{q+3} + \dots) \times \\
 &\quad \times (X^{p_1} - \frac{q}{1} X^{(q-1)p_1} (X^{r_1} + X^{r_2} + X^{r_3} + \dots + X^{r_h} - X^{p_2} - X^{p_3} - \dots - X^{p_h}) \\
 &\quad + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} X^{(q-2)p_1} (X^{r_1} + X^{r_2} + X^{r_3} + \dots + X^{r_h} - X^{p_2} - X^{p_3} - \dots - X^{p_h})^2 \\
 &\quad - \frac{q^{3|1}}{1^{3|1}} X^{(q-3)p_1} (X^{r_1} + X^{r_2} + X^{r_3} \dots + X^{r_h} - X^{p_2} - X^{p_3} - \dots - X^{p_h})^3 \\
 &\quad \vdots \\
 &\quad \vdots \\
 &\quad \vdots)
 \end{aligned}$$

Werden die angezeigten Entwicklungen ausgeführt und wird die Vorzahl von x^n bestimmt, so ergibt sich folgende Darstellung zur Bestimmung der gesuchten Gruppenanzahl

$$\begin{aligned}
 3) A &= \frac{1}{1^{q-1|1}} \left((n-p_1 q-1)^{q-1|1} - q \left((n-[q-1]p_1-r_1-1)^{q-1|1} - (n-[q-1]p_1-p_2-1)^{q-1|1} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + (n-[q-1]p_1-r_2-1)^{q-1|1} - (n-[q-1]p_1-p_3-1)^{q-1|1} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + (n-[q-1]p_1-r_3-1)^{q-1|1} - (n-[q-1]p_1-p_4-1)^{q-1|1} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. \vdots \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + (n-[q-1]p_1-r_h-1)^{q-1|1} - (n-[q-1]p_1-p_h-1)^{q-1|1} \right) \right) \\
 &+ \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \left((n-[q-2]p_1-2r_1-1) + 2 \left((n-[q-2]p_1-r_1-r_2-1)^{q-1|1} + \frac{2.1}{1.2} (n-[q-2]p_1-2r_2-1)^{q-1|1} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + (n-[q-2]p_1-r_1-r_3-1)^{q-1|1} + 2 \left((n-[q-2]p_1-r_2-r_3-1)^{q-1|1} \right. \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + (n-[q-2]p_1-r_1-r_4-1)^{q-1|1} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. \vdots \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + (n-[q-2]p_1-r_1-r_h-1)^{q-1|1} - (n-[q-2]p_1-r_2-p_h-1)^{q-1|1} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - (n-[q-2]p_1-r_1-p_2-1)^{q-1|1} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - (n-[q-2]p_1-r_1-p_3-1)^{q-1|1} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. \vdots \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - (n-[q-2]p_1-r_1-p_h-1)^{q-1|1} + \frac{2.1}{1.2} (n-[q-2]p_1-2p_h-1)^{q-1|1} \right) \right)
 \end{aligned}$$

$$- \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left((n-[q-3]p_1-3r_1-1)^{q-1-1} + 3 \begin{vmatrix} (n-[q-3]p_1-2r_1-r_2-1)^{q-1-1} & + \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 2} (n-[q-3]p_1-r_1-2r_2-1)^{q-1-1} \dots \\ (n-[q-3]p_1-2r_1-r_3-1)^{q-1-1} & + 2 (n-[q-3]p_1-r_1-r_2-r_3-1)^{q-1-1} \\ \vdots & \vdots \\ (n-[q-3]p_1-2r_1-p_h-1)^{q-1-1} & - (n-[q-3]p_1-r_1-r_2-p_h-1)^{q-1-1} \\ \vdots & \vdots \\ & + (n-[q-3]p_1-r_1-2p_h-1)^{q-1-1} \end{vmatrix} \right)$$

Das Gesetz, welches dieser Darstellung zu Grunde liegt, ist leicht erkennbar. Es läßt sich in Zeichen auf folgende Art ausdrücken

$$4) A = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \left(\sum_{m=0}^{m=x} (-)^m y_2 + y_3 + y_4 + \dots y_h \frac{m^{m-1}}{1^{z_1} 1^{z_2} \dots 1^{z_h} 1^{y_2} 1^{y_3} \dots 1^{y_h}} \right. \\ \left. \times \frac{(n-[q-m]p_1-z_1r_1-z_2r_2-z_3r_3-\dots-z_hr_h-y_2p_2-y_3p_3-\dots-y_hp_h-1)^{q-1-1}}{1^{q-1-1}} \right)$$

Hierin ist allmählig 0, 1, 2, 3, . . . q statt x zu setzen, für jeden einzelnen Werth von x ist nach dem zweiten Σ

$$x = m = y_2 + y_3 + y_4 + \dots + y_h + z_1 + z_2 + z_3 + \dots + z_h$$

beizubehalten. Für m sind alle möglichen Summen der Versetzungen mit Wiederholungen aus den Elementen 0, 1, 2, 3, . . . x zu derjenigen Classe zu bilden, welche entsteht, wenn die Gröfsen

$$y_2, y_3, y_4, \dots y_h, z_1, z_2, z_3, \dots z_h$$

als Einheiten betrachtet werden. Die Gröfsen

$$y_2, y_3, y_4, \dots y_h$$

beziehen sich auf die Stellenzahlen $p_2, p_3, p_4, \dots p_h$ und

$$z_1, z_2, z_3, z_4, \dots z_h$$

auf $r_1, r_2, r_3, r_4, \dots r_h$.

Die Uebereinstimmung der hier gefundenen Formel mit der unter 8 §. 4, Pg. 17 gefundenen zeigt sich leicht. Die Gleichung 9 §. 3 leitet sich aus dieser ab, wenn $p_1 = 0$ gesetzt wird.

Die hier gefundene Gleichung ist sehr allgemein und vieler Anwendung fähig, denn die Stellenzahlen der in Frage kommenden

Elementen-Reihen sind ganz willkürlich und können deswegen in jeden möglichen Zusammenhang gebracht werden. Daher lassen sich auch die etwaigen Anwendungen auf specielle Fälle leicht machen. Aus ihr lassen sich leicht die Gleichungen ableiten, die in §. 1—3 gefunden wurden, wenn die Elementen-Reihen beschränkt und die Stellenzahl in den dort vorausgesetzten Zusammenhang gebracht werden, welcher den Weg zur Entwicklung der Gleichung 9 §. 3 bahnte. Wir führen jedoch diese Andeutungen nicht weiter aus, sondern wenden uns zur Entwicklung anderer noch nicht behandelter Fälle.

Soll die Anzahl der Gruppen bestimmt werden, welche entstehen, wenn die Versetzungen mit Wiederholungen zur Summe n in der q^{ten} Classe aus h Elementen-Reihen gebildet werden, deren Stellenzahlen mit der Einheit beginnen, im Uebrigen den in 1 angegebenen Bestimmungen unterliegen, so liegt folgendes Problem vor.

$$5) \quad A = P' [sn; \begin{matrix} a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{r_1} \\ b_1, b_2, b_3, b_4, \dots, a_{r_2} \\ c_1, c_2, c_3, c_4, \dots, a_{r_3} \\ \vdots \\ h_1, h_2, h_3, h_4, \dots, h_{r_h} \end{matrix}]^q$$

Die Gruppenanzahl ergibt sich, wenn in der Darstellung 3 $p_1 = p_2 = p_3 = \dots = p_h = 0$ gesetzt wird. Sie ist

$$6) \quad A = \frac{1}{1^{q-1|1}} \left(h^q (n-1)^{q-1|1} - q h^{q-1} [(n-r_1-1)^{q-1|1} + (n-r_2-1)^{q-1|1} \dots + (n-r_h-1)^{q-1|1}] \right. \\ \left. + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} h^{q-2} \left((n-2r_1-1)^{q-1|1} + 2 \begin{vmatrix} (n-r_1-r_2-1)^{q-1|1} \\ (n-r_1-r_3-1)^{q-1|1} \\ \vdots \\ (n-r_1-r_h-1)^{q-1|1} \end{vmatrix} + \frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 2} \begin{vmatrix} (n-2r_2-1)^{q-1|1} \\ (n-r_2-r_3-1)^{q-1|1} \\ (n-r_2-r_4-1)^{q-1|1} \\ \vdots \\ (n-r_2-r_h-1)^{q-1|1} \\ (n-2r_h-1)^{q-1|1} \end{vmatrix} \right) \right) \\ = \sum_{x=0}^{m-1} (-)^x \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{z_1=0}^{m-1} \frac{m^{m-1}}{1^{z_1|1} 1^{z_2|1} \dots 1^{z_h|1}} \frac{(n-z_1 r_1 - z_2 r_2 - \dots - z_h r_h - 1)^{q-1|1}}{1^{q-1|1}} \right)$$

Hierin ist für jeden Werth von x

$$m = x = z_1 + z_2 + z_3 + \dots + z_h$$

zu setzen. Die Versetzungen mit Wiederholungen sind für jeden Werth von m zur h^{ten} Classe aus den Elementen $0, 1, 2, \dots, x$ zu den verschiedenen Summen, welche durch m angedeutet werden, zu bilden.

Die gleiche Darstellung hätte sich ergeben, wenn man die nach 5 erforderlichen Polynomen eingeführt und dann die dadurch bedingten Entwicklungen gemacht hätte.

Das in §. 8 Nro. 9 gegebene Problem ist ein specieller Fall des hier vorliegenden. Soll endlich die Anzahl der Gruppen bestimmt werden, welche entstehen, wenn die Schlusselemente der in 1 §. 10 gegebenen Elementen-Reihen sämmtlich einander gleich sind, so liegt folgendes Problem in Frage

$$7) A = P' [sn; a_{p_1+1}, a_{p_1+2}, a_{p_1+3}, \dots, a_r \\ b_{p_2+1}, b_{p_2+2}, b_{p_2+3}, \dots, b_r \\ c_{p_3+1}, c_{p_3+2}, c_{p_3+3}, \dots, c_r \\ \vdots \\ h_{p_h+1}, h_{p_h+2}, h_{p_h+3}, \dots, h_r]^q$$

Die gesuchte Gruppenanzahl ergibt sich, wenn in 3, $r_1=r_2=r_3=r_4=\dots=r_h=r$ gesetzt wird. Wird hiebei eine veränderte Ordnung getroffen, so ergibt sich

$$8) A = \frac{1}{1^{q-1|1}} \left((n-qp_1-1)^{q-1|-1} - q \left(h(n-[q-1]p_1-r-1)^{q-1|-1} - \begin{vmatrix} (n-[q-1]p_1-p_2-1)^{q-1|-1} \\ (n-[q-1]p_1-p_3-1)^{q-1|-1} \\ \vdots \\ (n-[q-1]p_1-p_h-1)^{q-1|-1} \end{vmatrix} \right) \right. \\ \left. + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|1}} \left(h^2(n-[q-1]p_1-2r-1)^{q-1|-1} - 2h \begin{vmatrix} (n-[q-1]p_1-r-p_2-1)^{q-1|-1} + \dots \\ (n-[q-1]p_1-r-p_3-1)^{q-1|-1} \\ \vdots \\ (n-[q-1]p_1-r-p_h-1)^{q-1|-1} \end{vmatrix} \right) \right. \\ \left. \vdots \right) \\ = \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{y=0}^{y=m} (-)^y h^y \frac{m^{m|-1}}{1^{y|1} 1^{z_2|1} 1^{z_3|1} \dots 1^{z_h|1}} \frac{(n-[q-m]p_1-yr-z_2p_2-\dots-z_hp_h-1)^{q-1|-1}}{1^{q-1|1}} \right)$$

Für jeden einzelnen Werth von x ist

$$m = x = y + z_2 + z_3 + z_4 + \dots + z_h$$

zu setzen. Die Versetzungen mit Wiederholungen zur jedesmaligen Summe m sind in der h ten Classe aus den Elementen $0, 1, 2, \dots, m$ zu bilden.

Soll der Inbegriff der Gruppenanzahlen der Summen von s bis n für die unter 1, 5, 7 angeführten Probleme bestimmt werden, so ergeben sich dieselben leicht, wenn die bezüglichen Fakultäten in 3, 6 und 8 um die Einheit erhöht werden. Es ist dann für das unter 1 gegebene Problem

$$\begin{aligned} 9) \sum_{s+1}^n A = & \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{x=m}^{x=n} (-)^{y_2+y_3+\dots+y_h} \frac{m^{m|-1}}{1^{z_1|1} 1^{z_2|1} \dots 1^{z_h|1} 1^{y_2|1} 1^{y_3|1} \dots 1^{y_h|1}} \right. \\ & \times \left. \frac{(n-[q-m]p_1-z_1r_1-z_2r_2-z_3r_3-\dots-z_hr_h-y_2p_2-y_3p_3-\dots-y_hp_h)^{q|-1}}{1^{q|1}} \right) \\ & - \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{x=m}^{x=n} (-)^{y_2+y_3+\dots+y_h} \frac{m^{m|-1}}{1^{z_1|1} 1^{z_2|1} 1^{z_3|1} 1^{z_h|1} 1^{y_2|1} 1^{y_3|1} \dots 1^{y_h|1}} \right. \\ & \times \left. \frac{(s-[q-m]p_1-z_1r_1-z_2r_2-z_3r_3-\dots-z_hr_h-y_2p_2-y_3p_3-\dots-y_hp_h)^{q|-1}}{1^{q|1}} \right) \end{aligned}$$

Die hierher gehörigen Bedingungsgleichungen sind die nämlichen, welche bei 4 angegeben wurden.

Aus 6 ergibt sich

$$\begin{aligned} 10) \sum_{s+1}^n A = & \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{x=m}^{x=n} \frac{m^{m|-1}}{1^{z_1|1} 1^{z_2|1} \dots 1^{z_h|1}} \frac{(n-z_1r_1-z_2r_2-\dots-z_hr_h)^{q|-1}}{1^{q|1}} \right) \\ & - \sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x|1}} h^{q-x} \left(\sum_{x=m}^{x=n} \frac{m^{m|-1}}{1^{z_1|1} 1^{z_2|1} 1^{z_3|1} 1^{z_h|1}} \frac{(s-z_1r_1-z_2r_2-\dots-z_hr_h)^{q|-1}}{1^{q|1}} \right) \end{aligned}$$

Die dort gegebenen Bedingungsgleichungen sind auch hier gültig. Aus 8 ergibt sich

$$\begin{aligned}
 11) \sum_{s+1}^n A = & \sum_{x=0}^{m-1} (-)^x \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{h=0}^{m-x-1} (-)^h \frac{m^{m-1}}{1^{y|1} 1^{z_2|1} 1^{z_3|1} \dots 1^{z_h|1}} \right. \\
 & \times \left. \frac{(n-[q-m]p_1 - y r - z_2 p_2 - \dots - z_h p_h)^{q|1-1}}{1^{q|1}} \right) \\
 & - \sum_{x=0}^{m'-1} (-)^x \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} \left(\sum_{h=0}^{m'-x-1} (-)^h \frac{m'^{m'-1}}{1^{y|1} 1^{z_2|1} 1^{z_3|1} \dots 1^{z_h|1}} \right. \\
 & \times \left. \frac{(s-[q-m]p_1 - y r - z_2 p_2 - z_3 p_3 - \dots - z_h p_h)^{q|1-1}}{1^{q|1}} \right)
 \end{aligned}$$

Die zu 8 angegebenen Bedingungsgleichungen bleiben auch hier in Kraft.

Der Rückblick auf die beiden hier vorgelegten Methoden zeigt, daß beide gleich allgemein sind, denn beide führen zu denselben allgemeinen Gleichungen. Die zweite hat besonders ihren Vorzug darin, daß sie sich sehr bequem und geschickt auf specielle Fälle anwenden läßt und dabei sehr elegante Gleichungen liefert, die vielleicht mit ungleich größerer Mühe nach der ersten Methode aufgesucht werden müßten.

§. 11.

Die Anwendungen, welche die bisher aufgefundenen Gleichungen auf Wahrscheinlichkeits-Rechnung zu lassen, sind leicht zu erkennen, denn jede Darstellung, welche die Gruppenanzahl der Versetzungen mit Wiederholungen zu einer bestimmten Summe in irgend einer Classe, oder den Inbegriff mehrerer Summen in irgend einer Classe angibt, beantwortet zugleich ein Problem aus der Wahrscheinlichkeits-Rechnung. Für diesen Fall ist nämlich nur noch übrig, die gefundene Gruppenanzahl durch die Anzahl aller Gruppen oder durch den Inbegriff aller Summen in irgend eine Classe zu theilen, welche entstehen, wenn die Versetzungen mit Wiederholungen aus sämtlichen Elementen in dieser Classe gebildet werden.

Die zunächst liegenden Anwendungen sind die auf die Würfel und das Würfelspiel.

Die Würfel (von sechs gleich grossen Quadraten eingeschlossene, gleich dichte Körper) sind bekanntlich auf ihren verschiedenen Seiten mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 bezeichnet. Wird mit einem Würfel wiederholt geworfen, so läßt sich dieses Werfen mit Ziehungen vergleichen, welche wiederholt aus einer Urne gemacht werden, worin sechs Kugeln enthalten sind, von denen jede eine von den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Zeichen trägt, und jede nach der Ziehung in die Urne zurückgeworfen wird. Das gleichzeitige Spielen mit mehreren Würfeln läßt sich als ein gleichzeitiges Ziehen je einer Kugel aus mehreren Urnen betrachten, von denen jede sechs Kugeln der bezeichneten Art enthält.

Wird nämlich mit zwei oder mehreren Würfeln geworfen, so können Würfe von verschiedenem Werthe oder verschiedenen Summen fallen, die ganz dem Zufalle unterliegen, bei deren Entstehung aber nicht alle, sondern nur sechs Zahlen mitwirken können. Es kommen daher hiebei die Versetzungen mit Wiederholungen zu bestimmten Summen aus einer beschränkten Elementen-Anzahl in Betrachtung.

Wird nun mit p Würfeln geworfen, und gefragt: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, daß die geworfenen Zahlen die Summe n betragen? So fällt die Zahl der günstigen Fälle mit der Anzahl der Gruppen zusammen, welche entstehen, wenn die Versetzungen mit Wiederholungen aus sechs Elementen in der p^{ten} Classe gebildet werden.

Diese Anzahl bestimmt sich leicht, wenn in der Gleichung 6 §. 1 $n = n$, $r = 6$, $p = q$ gesetzt wird. Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich, wenn dieser Ausdruck durch die Anzahl aller Gruppen gemessen wird, welche bei Bildung der Versetzungen mit Wiederholungen aus sechs Elementen in der p^{ten} Classe entstehen. Hiernach ist

$$1) w = \frac{(n-1)^{p-1}}{1^{p-1} 6^p} - p \frac{(n-7)^{p-1}}{1^{p-1} 6^p} + \frac{p^{2|1} (n-13)^{p-1}}{1^{2|1} 1^{p-1} 6^p} - \frac{p^{3|1} (n-19)^{p-1}}{1^{3|1} 1^{p-1} 6^p} + \dots$$

Specielle Fälle bestimmen sich hieraus leicht. So ist die Wahrscheinlichkeit mit drei Würfeln die Summe 10 oder 11 zu werfen

$\frac{27}{216} = \frac{1}{8}$ die Summe 5 oder 16 zu werfen $\frac{6}{216} = \frac{1}{36}$ und es kann jemand Eins gegen Eins wetten, daß er in acht Würfeln einmal die Summe 10, oder daß er in 36 Würfeln einmal die Summe 5 treffen werde. Dasselbe gilt von den Summen 11 und 16. Oder es kann jemand Eins gegen Sieben wetten, daß er in einem Wurf die Summe 10 und Eins gegen 35, daß er die Summe 5 mit drei Würfeln treffen werde.

Wird mit acht Würfeln geworfen, so ist die Wahrscheinlichkeit die Summe 28 zu werfen $\frac{135954}{1679616}$, eine der Summen 40 oder 16 zu werfen $\frac{6147}{1679616} = \frac{683}{186624}$; eine der Summen 9 oder 47 zu werfen $\frac{8}{1679616} = \frac{1}{209952}$ eine der Summen 1 oder 48 zu werfen $\frac{1}{1679616}$ u. s. w. Es kann daher jemand mit geringem Vortheile Eins gegen Eins wetten, daß in 274 Würfeln einmal die Summe 16 fallen werde, oder Eins gegen 273, daß er sie im ersten Wurf werfen werde, oder Eins gegen 209951, daß er die Summe 9 im ersten Wurf treffen werde u. s. w. Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten anderer Fälle läßt sich mit der Gleichung 1 leicht weiter verfolgen.

Wird die Gleichung 6 §. 1 benützt, $r=6$ und für q die Anzahl der Würfel gesetzt und werden dann für jede bestimmte Würfel-Anzahl allmählig die verschiedenen Summen statt n eingeführt, so ergibt sich dadurch eine Zusammenstellung für die Zahl der Würfe, welche bei einer bestimmten Summe mit irgend einer beliebigen Würfel-Anzahl gemacht werden können. Diese Zusammenstellung ist in der beifolgenden Tafel enthalten.

Summen, welche mit einem, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Würfeln geworfen werden können.

Zahl der Würfel.								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1							
2	1	1						
3	1	2	1					
4	1	3	3	1				
5	1	4	6	4	1			
6	1	5	10	10	5	1		
7		6	15	20	15	6	1	
8		5	21	35	35	21	7	1
9		4	25	56	70	56	28	8
10		3	27	80	126	126	84	36
11		2	27	104	205	252	210	120
12		1	25	125	305	456	462	330
13			21	140	420	756	917	792
14			15	146	540	1161	1667	1708
15			10	140	651	1666	2807	3368
16			6	125	735	2247	4417	6147
17			3	104	780	2856	6538	10480
18			1	80	780	3431	9142	16808
19				56	735	3906	12117	25488
20				35	651	4221	15267	36688
21				20	540	4332	18327	50288
22				10	420	4221	20993	65808
23				4	305	3906	22967	82384
24				1	205	3431	24017	98813
25					126	2856	24017	113688
26					70	2247	22967	125588
27					35	1666	20993	133288
28					15	1161	18327	135954
29					5	756	15267	133288
30					1	456	12117	125588
31						252	9142	113688
32						126	6538	98813
33						56	4417	82384
34						21	2807	65808
35						6	1667	50288
36						1	917	36688
37							462	25488
38							210	16808
39							84	10480
40							28	6147
41							7	3368
42							1	1708
43								792
44								330
45								120
46								36
47								8
48								1

Die Zahl der Würfel erhebt sich bis auf acht und die Summen bis auf 48. Die Einrichtung der Tafel selbst ist leicht verständlich. Um die Zahl der Fälle, wie oft eine bestimmte Zahl mit einem oder mehreren Würfeln geworfen werden kann, in dieser Tafel zu finden, ist nöthig die fragliche Summe in der vordersten Vertikalreihe, und die Zahl der Würfel in der obersten Horizontalreihe zu suchen, beide bis zu dem Felde, wo sie sich vereinigen, zu verfolgen. Die diesem Felde eingezeichnete Zahl gibt die gesuchte Anzahl an. *)

Wird die Gleichung 11 §. 4, Pg. 19 benützt, so wird der Inbegriff der Gruppenanzahlen für Summen, die innerhalb gewisser Grenzen liegen, gewonnen. Soll nämlich bestimmt werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, daß nur die Summen von m his n erscheinen, wenn mit p Würfeln geworfen wird, so ergibt sich dieß, wenn in der genannten Gleichung zuerst $q=p$, $r=6$, dann wiederholt $q=p$, $r=6$ und $n=m$ gesetzt, die erhaltenen Resultate durch 6^p gemessen werden und das letzte Resultat von dem ersten abgezogen wird. Hier- nach ist

$$2) w = \sum (-)^x \frac{q^{x|1-1}}{4^{x|1}} \frac{(n-6x)^{p|1-1}}{4^{p|1} 6^p} - \sum (-)^x \frac{q^{x|1-1}}{4^{x|1}} \frac{(m-6x)^{p|1-1}}{4^{p|1} 6^p}$$

oder

*) Montmort hat in seinem Werke: *Analyse sur les jeux de hazards* II. ed. Par. 1714 Pg. 51 eine Tafel mitgetheilt, die sich bis auf die Würfe mit 5 Würfeln erstreckt, jedoch nicht ganz vollständig ist. Pg. 203 in demselben Werke ist eine vollständige, sich bis auf die Würfe mit neun Würfeln erstreckende Tafel mitgetheilt. Jac. Bernoulli hat in seinem Werke: *Ars conjectandi* Basil. 1713 Pg. 24 auch eine Tabelle gegeben, die sich bis auf Würfe mit sechs Würfeln erstreckt, aber auch nicht ganz vollständig ist. Die dort gegebenen Resultate sind auf Addition aus niedern Summen gegründet. Auch in Klügels *mathemat. Wörterbuche* V. Band 2. Abtheilung findet sich Pg. 927 eine nicht ganz vollständige Tafel, die sich auf Würfe mit acht Würfeln erhebt. Die Zahlen der hier mitgetheilten Formel sind nach der Gleichung 6 §. 1 berechnet.

$$3) w = \frac{n^{p-1}}{1^{p-1}6^p} - p \frac{(n-6)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} + \frac{p(p-1)(n-12)^{p-1}}{1 \cdot 2 \cdot 1^{p-1}6^p} - \frac{p(p-1)(p-2)(n-18)^{p-1}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1^{p-1}6^p} + \dots$$

$$- \frac{m^{p-1}}{1^{p-1}6^p} + p \frac{(m-6)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} - \frac{p(p-1)(m-12)^{p-1}}{1 \cdot 2 \cdot 1^{p-1}6^p} + \frac{p(p-1)(p-2)(m-18)^{p-1}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1^{p-1}6^p} - \dots$$

Die vorstehenden Gleichungen schliessen die Summen $m+1$, $m+2$, $m+3 \dots n$ ein.

A und B spielen mit p Würfeln unter folgender Bedingung miteinander: A gewinnt, wenn das arithmetische Mittel zwischen der höchsten und niedrigsten Summe oder eine höhere Summe fällt; B, wenn eine der niedrigeren Summen fällt. Welches ist das Verhältniss der Hoffnung beider zu einander?

Ist die Zahl der Würfel, womit gespielt wird, ungerade, so ist das arithmetische Mittel $3p + \frac{1}{2}p$, folglich eine gebrochene Zahl. Diese Summe kann nicht geworfen werden. Das Loos der Spieler ist für diesen Fall gleich. Diefs bestätigt sich auch durch Ansicht der vorliegenden Tabelle. Ist aber die Zahl der Würfel gerade, so ist das arithmetische Mittel $3p + \frac{1}{2}p$ also eine Summe die geworfen werden kann. Der höchste Wurf, welcher in diesem Falle möglich ist, wird $6p$ seyn. Der Mittelwurf wird seyn $3p + \frac{1}{2}p = a + 1$. Hiernach ist die Wahrscheinlichkeit für A.

$$4) w = \frac{(6p)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} - p \frac{([p-1]6)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} + \frac{p^{2-1}}{1^{2-1}} \frac{([p-2]6)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} - \dots$$

$$- \frac{a^{p-1}}{1^{p-1}6^p} + p \frac{(a-6)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} - \frac{p^{2-1}}{1^{2-1}} \frac{(a-12)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} + \dots$$

oder

$$w = 1 - \frac{(3p + \frac{1}{2}p - 1)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} + p \frac{(3p + \frac{1}{2}p - 7)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} - \frac{p^{2-1}}{1^{2-1}} \frac{(3p + \frac{1}{2}p - 13)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} + \dots$$

Die Wahrscheinlichkeit für B ist

$$5) w = \frac{(3p + \frac{1}{2}p - 1)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} - p \frac{(3p + \frac{1}{2}p - 7)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} + \frac{p^{2-1}}{1^{2-1}} \frac{(3p + \frac{1}{2}p - 13)^{p-1}}{1^{p-1}6^p} - \dots *)$$

*) Johann Bernoulli hat die vorstehende Aufgabe im 4. Bande seiner Opp. omn. Lausannae et Genevae 1742 Pg. 31 und 32 aufgestellt, und das Resultat der Auflösung ohne Entwicklung mitgetheilt. Die von ihm gegebene Auflösung ist ganz unrichtig. Er sagt das Verhältniss beider Wahrscheinlichkeiten sey (in unserer Bezeichnung dargestellt)

Wird mit 2 Würfeln geworfen, so ist das Verhältniß beider Wahrscheinlichkeiten $\frac{21}{36} : \frac{15}{36}$; bei vier Würfeln ist es $\frac{721}{1296} : \frac{575}{1296}$ bei sechs Würfeln ist es $\frac{25494}{46656} : \frac{21162}{46656}$ u. s. w. Bei näherer Untersuchung zeigt sich, daß sich das Verhältniß der Wahrscheinlichkeiten immer mehr verkleinert, je größer die Zahl der Würfel ist, mit denen geworfen wird, und daß sich also die Hoffnung beider immer mehr der Gleichheit nähert, je größer die Zahl der Würfel wird, ohne in der That sich gleich zu werden.

A spielt mit B unter folgender Bedingung mit acht Würfeln. A gewinnt, wenn eine der Nummern 21, 22, ... 35 fällt; B, wenn eine der übrigen fällt. Welches ist die Wahrscheinlichkeit für A, welches für B?

Die Wahrscheinlichkeit für A ergibt sich, wenn $p=35$, $p=8$ und $m=20$ in 3 gesetzt wird. Sie ist

$$6) w = \frac{1}{4^{20}} (35^{20-1} - 8 \cdot 29^{20-1} + 28 \cdot 23^{20-1} - \dots - 20^{20-1} + 8 \cdot 14^{20-1} - 28 \cdot 8^{20-1}) = \frac{1475668}{1679616}$$

Die Wahrscheinlichkeit für B ist

$$7) w_1 = 1 - w = \frac{203948}{1679616}$$

Setzt nun B bei jedem Wurf eine bestimmte Summe aus, so wird er sie an A verlieren, so oft eine der Zahlen 21—35 geworfen wird. Soll nun das Spiel gerecht seyn, so muß er von A die eingesetzte Summe $\frac{1475668}{203948} = 7 \frac{48032}{203948}$ mal gewinnen, so oft eine der übrigen, ihm günstigen Zahlen fällt.

Dieses Spiel kommt vor und bildet dann die Grundlage für die sogenannten Würfeltische, die hie und da aufgestellt sind, um von der

$$6^p + \frac{(3p + \frac{1}{2}p - 1)^{p-1-1}}{4^{p-1-1}} : 6^p - \frac{(3p + \frac{1}{2}p - 1)^{p-11-1}}{4^{p-1-1}}$$

was mit der hier gegebenen richtigen Auflösung nicht harmonirt. Eine andere Auflösung dieses Problems habe ich in meinen Forschungen in der höh. Anal. Pg. 63 u. s. f. mitgetheilt und dort das Nähere hierüber nachgewiesen.

Spiellust Vorthail zu ziehen. Die Einrichtung dieser Würfeltische ist dann folgende. Auf einem Tische sind in Kreisform, wie die Ziffern auf einer Uhrentafel, die Zahlen von 8 bis 48 aufgezeichnet, jedoch nicht in der natürlichen Reihenfolge, sondern ganz willkührlich neben einander geschrieben. Die 15 Nummern von 21 bis 35 etwa sind nicht besetzt, dagegen die übrigen 26 mit bestimmten Preisen bezeichnet, oder mit anlockenden werthvollen Gegenständen, in verschiedenen Abstufungen, besetzt. Will jemand sein Glück versuchen, so muß er eine bestimmte Einlage geben, die er dann nach dem Wurfe auch im Falle des Gewinnens nicht mehr zurück erhält. Wird nun ein stufenförmiges Steigen der Preise für solche Würfeltische angeordnet, so könnte dann, um ein gerechtes Spiel zu erhalten, folgendes gewählt werden:

Für jede der Zahlen 20 und 36 zahlt der Spielhalter										1 mal den Einsatz			
"	"	"	"	19	"	37	"	"	"	2	"	"	"
"	"	"	"	18	"	38	"	"	"	3	"	"	"
"	"	"	"	17	"	39	"	"	"	4	"	"	"
"	"	"	"	16	"	40	"	"	"	8	"	"	"
"	"	"	"	15	"	41	"	"	"	16	"	"	"
"	"	"	"	14	"	42	"	"	"	32	"	"	"
"	"	"	"	13	"	43	"	"	"	100	"	"	"
"	"	"	"	12	"	44	"	"	"	300	"	"	"
"	"	"	"	11	"	45	"	"	"	500	"	"	"
"	"	"	"	10	"	46	"	"	"	1000	"	"	"
"	"	"	"	9	"	47	"	"	"	10000	"	"	"
"	"	"	"	8	"	48	"	"	"	50000	"	"	" (ungef.)

als reinen Gewinn aus. Bei dieser Vertheilung ist noch immer ein nicht unbedeutender Vorthail auf Seiten des Spielhalters. Dieser Vorthail steht aber mit demjenigen, welchen solche Spieltische in der Wirklichkeit abwerfen, in gar keinem Verhältnisse, wenn man bedenkt, daß der Werth sämmtlicher von dem Spielhalter ausgesetzten Preise kaum dem 2000fachen höchstens dem 3000fachen Einsatz des Spielers gleichkommt. Solche Spieltische beruhen daher auf sehr ungerechter Grundlage, wuchern mit dem Besitze der

Spielenden auf die auffallendste Weise, sollten daher in keinem Staate geduldet werden, und es ist Pflicht jeder Obrigkeit, sie ganz zu unterdrücken.

Ein anderes hierher gehöriges, sehr verbreitetes Spiel ist das sogenannte Knöcheln (passe dix). Dieses Spiel wird mit drei Würfeln von einer beliebigen Zahl von Theilnehmern gespielt. Einer derselben, Banquier genannt, hat die Hand und setzt eine beliebige Summe aus, die von einem oder mehreren zugleich entgegen gehalten wird. Darauf wirft der Banquier die Würfel aus einem Becher. Fällt ein Wurf, der 11 oder darüber beträgt, worin wenigstens zwei gleiche Zahlen, Pasch genannt, vorkommen, so hat der Banquier gewonnen. Er zieht in diesem Falle die ganze ausgesetzte Summe. Er kann nun das Spiel fortsetzen, und muß dann die ganze Summe im Spiele stehen lassen, oder kann dieselbe zurückziehen und muß dann den Becher seinem Nachfolger überlassen. Fällt aber ein Wurf der zehn und darunter beträgt, worin wenigstens zwei gleiche Zahlen vorkommen, so hat er die ganze Summe verloren. Das Spiel geht dann an seinen Nachfolger über, der es unter den genannten Bedingungen fortsetzt. Ein Wurf, worin nicht wenigstens zwei gleiche Zahlen vorkommen, entscheidet über das Spiel nicht.

Fragt man nun, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, mit drei Würfeln die Summe zehn oder eine höhere zu werfen, so ergibt sich aus 3

$$w = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6^3} [18 \cdot 17 \cdot 16 - 3 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 + 3 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 - 10 \cdot 9 \cdot 8 + 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2] = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}$$

Die Wahrscheinlichkeit, mit drei Würfel die Summe zehn und eine niedrigere zu werfen ist nach derselben Gleichung

$$w = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6^3} [10 \cdot 9 \cdot 8 - 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2] = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}$$

Man erkennt, daß beide Wahrscheinlichkeiten einander gleich sind, daß also hier kein Vorthail vorherrscht. Da aber nur die Würfe, worin wenigstens zwei gleiche Zahlen erscheinen, über Ge-

winn und Verlust entscheiden, so ist die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, wie oft ein Pasch erscheinen werde.

Diese Wahrscheinlichkeit bestimmt sich leicht, wenn man diejenige Würfe angibt, worin keine gleiche, sondern lauter ungleiche Zahlen bei dem Spielen mit drei Würfeln erscheinen werden, und das gefundene Resultat von der Einheit abzieht. Hiernach ist

$$8) w = 1 - \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6^3} = \frac{96}{216} = \frac{4}{9}$$

Untersucht man nun, wie oft in den Summen von 11 bis 18 und von 3 bis 10 wenigstens zwei gleiche Zahlen vorkommen können, so ergibt sich aus einer ganz einfachen Betrachtung, daß die Anzahl derjenigen Fälle, worin in den Summen von 11 — 18 wenigstens zwei gleiche Zahlen vorkommen, gerade so groß ist, als diejenige, worin in den Summen von 3 — 10 wenigstens zwei gleiche vorkommen. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein für den Banquier günstiges Resultat erscheinen werde, ist demnach $= \frac{1}{2}$ und eben so groß, als diejenige, daß ein für den Spieler günstiges erscheinen werde.

Dieses Spiel beruht dem Gesagten zufolge auf ganz richtiger Grundlage und der Banquier hat vor dem Mitspieler durchaus keinen Vortheil. In dieser Beziehung kann dem Spiele kein Vorwurf gemacht werden. Die Lockungen jedoch, die mit ihm verbunden sind, die Möglichkeit, mit kleinen Einlagen hohe Summen zu gewinnen, da die ausgesetzten Summen in geometrischer Progression steigen, und der Umstand, daß ein Spieler durch Ueberlegung und Scharfblick bevorstehenden Verlust nicht von sich abwenden oder mindern kann, charakterisiren es zu einem die Leidenschaft sehr aufregenden und deswegen gefährlichen Spiele, das mit Recht nicht geduldet wird.

Untersuchen wir die Gleichung 8 näher, so zeigt sie, wie oft wenigstens zwei gleiche Zahlen mit drei Würfeln werden geworfen werden. Nach ihr kann jemand Eins gegen Eins wetten, daß in neun Würfen viermal ein Pasch oder drei gleiche Zahlen sich zeigen

werden, oder was dasselbe ist: jemand kann 4 gegen 5 wetten, daß in einem Wurf wenigstens zwei gleiche Zahlen fallen werden. Es kann daher jemand mit einigem Vortheile Eins gegen Eins wetten, daß er in fünf Würfeln zweimal wenigstens zwei gleiche Zahlen werfen werde.

Bei dem Knöcheln werden öfters Würfe vorkommen, welche das Spiel nicht entscheiden. Fragt man daher, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, daß das Spiel im zehnten Wurf noch nicht entschieden seyn werde, so bestimmt sich diese dadurch leicht, daß zehnmal hintereinander lauter ungleiche Zahlen geworfen werden müssen, um dieser Voraussetzung zu genügen. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

$$w = \frac{5^{10}}{9^{10}} - \frac{9765625}{3486784401}$$

Der Werth dieses Bruches ist zwischen 0,0028 und 0,0030 eingeschlossen, und man kann daher mit Vortheil 343 gegen 1 wetten, daß das Spiel in zehn Würfeln entschieden seyn werde.

§. 12.

In einer Urne sind r , mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, ... r bezeichnete Kugeln enthalten. Es wird q mal gezogen, jedesmal eine Kugel herausgenommen und nach der Ziehung in die Urne zurückgeworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Zahlen der gezogenen Kugeln die Summe n betragen?

Die Zahl der günstigen Fälle ist unmittelbar durch die Gleichung 6 §. 1 gegeben. Die Zahl aller möglichen Fälle ist r^q . Hiernach ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$1) w = \sum_{x=0}^{x=q} \binom{q}{x} \frac{q^{x-1}}{1^{x-1}} \frac{(n-xr-1)^{q-1-x}}{1^{q-1-x} r^q}$$

Durch eine kleine Aenderung dieser Gleichung läßt sich eine Anwendung auf unser Zahlensystem machen.

In einer Urne sind alle Zahlen enthalten, welche q Ziffern oder weniger haben. Man zieht einmal. Wie groß ist die Wahrschein-

lichkeit, daß eine Zahl erscheint, deren Ziffern zusammen die Summe n bilden?

Unserm Zahlensystem liegen die Versetzungen mit Wiederholungen aus zehn erzeugenden Elementen zu den verschiedenen Classen zu Grunde die Stellenzahlen der erzeugenden Elemente beginnen aber mit 0. Die Zahl der günstigen Fälle ist daher in folgendem Ausdrucke begriffen

$$P' [sn; a_0, a_1, a_2, a_3 \dots a_9]^q$$

Hiernach ist die Gleichung 2 §. 4, Pg. 15 und die Gleichung 1 dieses §. anzuwenden, und $n+q$ statt n in letzterer zu setzen. Die Anzahl aller möglichen Zahlen, welche q oder weniger Ziffern haben, ist bekanntlich $10^q - 1$. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also

$$2) w = \frac{1}{1^{q-1}(10^q-1)} [(n+q-1)^{q-1-1} - q(n+q-1)^{q-1-1} + \frac{q(q-1)}{1 \cdot 2} (n+q-2)^{q-1-1} \dots]$$

Sind in einer Urne die Zahlen von 1 bis 9999 enthalten, und will jemand eine Zahl, deren Ziffern die Summe 30 betragen, ziehen, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß er seinen Wunsch erreichen werde $\frac{84}{9999}$ oder nahe $\frac{1}{119}$. Soll eine Zahl, deren Ziffern die Summe 12 betragen, gezogen werden, so ist die Wahrscheinlichkeit $\frac{415}{9999}$ oder nahe $\frac{1}{24}$.

In einer Urne sind alle Zahlen enthalten, welche q und weniger Ziffern haben. Man zieht eine Zahl. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine Zahl erscheint, deren Ziffern die Summe n betragen und worin die Zahlen 5 und 6 nicht vorkommen? Die Zahl der günstigen Fälle ist durch folgende Darstellung

$$P' [sn; a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_7, a_8, a_9]^q$$

bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich, wenn nach den oben gemachten Bemerkungen $n = n + q$, $p = 10$, $h = 5$, $k = 7$ in der Gleichung 5 §. 3, Pg. 12 gesetzt und das erhaltene Resultat durch $10 - 1$ gemessen wird. Sie ist

$$3) w = \frac{1}{1^{q-1} (10^q - 1)} \left((n+q-1)^{q-1} - q[(n+q-6)^{q-1} - (n+q-8)^{q-1} + (n+q-11)^{q-1}] \right. \\ \left. + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \left((n+q-11)^{q-1} - 2 \left[(n+q-13)^{q-1} - (n+q-16)^{q-1} \right] + \frac{2.1}{1.2} \left[(n+q-15)^{q-1} - 2(n+q-18)^{q-1} + (n+q-21)^{q-1} \right] \right) \right. \\ \left. \vdots \right)$$

Sind in einer Urne die 9999 ersten Zahlen enthalten und will jemand unter der genannten Bedingung eine Zahl ziehen, deren Ziffern die Summe 12 betragen, so ist die Wahrscheinlichkeit $\frac{207}{9999}$ oder nahe $\frac{1}{48}$, denn es sind nur 207 günstige Fälle unter 9999.

In einer Urne sind h Arten von Kugeln enthalten, von denen die erste r Kugeln zählt, die mit den r ersten Zahlen bezeichnet sind, die zweite $(r-1)$ Kugeln, die mit den Zahlen 2, 3, 4, . . . r bezeichnet sind u. s. f., die h^{te} Art r Kugeln zählt, die mit den Zahlen $h, h+1, h+2, . . . r$ bezeichnet sind. Man zieht q mal und nimmt jedesmal eine Kugel heraus, die nach der Ziehung in die Urne zurückgeworfen wird. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß solche Kugeln gezogen werden, deren Zahlen die Summe n hervorbringen?

Die Zahl der dem Unternehmen günstigen Fälle ist in den Gleichungen 1, 7 und 8 §. 7 angegeben. Die Zahl aller in der Urne enthaltenen Kugeln ist $\frac{h(h+1)}{1 \cdot 2} + hr = \frac{h(h+2r+1)}{2}$. Die Zahl aller möglichen Fälle ist hiernach $\frac{h^q (h+2r+1)^q}{2^q}$. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist demzufolge aus 7 Pg. 31.

$$4) w = \frac{2^q}{(h+2r+1)^q} \left(\frac{(n+q-1)^{2q-1}}{1^{2q-1} h^q} - \frac{q}{1} \left(\frac{(n+q-h-1)^{2q-1}}{1^{2q-1} h^q} + \frac{(n+q-r-2)^{2q-2}}{h^{q-1} 1^{2q-2}} \right) \right. \\ \left. + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \left(\frac{(n+q-2h-1)^{2q-1}}{1^{2q-1} h^q} + 2 \frac{(n+q-h-r-2)^{2q-2}}{1^{2q-2} h^{q-1}} + \frac{(n+q-2r-3)^{2q-3}}{1^{2q-3} h^{q-2}} \right) \right. \\ \left. \vdots \right)$$

Sind von der ersten Kugelart nur h Kugeln und von der letzten nur eine in der Urne enthalten, und die Bedingungen die gleichen, wie oben, so ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen der gezogenen Nummern die Summe n bilden werden, wenn $h=r$ in 4 gesetzt wird, wodurch die Zahl aller in der Urne enthaltenen Kugeln in $\frac{h(h+1)}{2}$ übergeht, und mit Rücksicht auf 15 Pg. 33

$$5) w = \frac{2^q}{(h+1)^q} \left(\frac{(n+q-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1} h^q} - q \left(\frac{(n+q-h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1} h^q} + \frac{(n+q-h-2)^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1} h^{q-1}} \right) \right. \\ \left. + \frac{q^{2|-1}}{1^{2|-1}} \left(\frac{(n+q-2h-1)^{2q-1|-1}}{1^{2q-1|1} h^q} + 2 \frac{(n+q-2h-2)^{2q-2|-1}}{1^{2q-2|1} h^{q-1}} + \frac{(n+q-2h-3)^{2q-3|-1}}{1^{2q-3|1} h^{q-2}} \right) \right. \\ \left. \vdots \right)$$

In einer Urne sind h Kugelarten enthalten, von denen die erste $(2h-1)$, die zweite $(2h-3)$, die dritte $(2h-5)$ u. s. w., die letzte eine Kugel zählt. Die Kugeln der ersten Art sind mit den Zahlen 1, 2, 3, ... $2h-1$, die der zweiten mit den Zahlen 2, 3, 4, ... $2h-2$ bezeichnet u. s. w., die Kugel der letzten Art ist mit h bezeichnet. Oder: in einer Urne sind h Kugeln enthalten, von denen eine die Zahl 1, zwei die Zahl 2, drei die Zahl 3 u. s. w., h die Zahl h , $(h-1)$ die Zahl $h+1$, $(h-2)$ die Zahl $(h+2)$ u. s. w., drei die Zahl $2h-3$, zwei die Zahl $2h-2$ und eine die Zahl $2h-1$ tragen. Man zieht q mal aus der Urne und nimmt jedesmal eine Kugel heraus, die nach der Ziehung in die Urne zurückgeworfen wird, und bemerkt die ihr aufgezeichnete Zahl. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auf den Kugeln erscheinenden Zahlen die Summe n betragen?

Die Zahl der dem Unternehmen günstigen Fälle ist durch die Darstellung 1 §. 9, Pg. 41 bezeichnet und dort in der Gleichung 3 und 4 bestimmt. Die Zahl aller möglichen Fälle ist $(h^2)^q$. Hieraus ergibt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$6) w = \frac{1}{1^{2q-1|1} h^{2q}} [(n+q-1)^{2q-1|-1} - 2q(n+q-h-1)^{2q-1|-1} + (2q)^{2|-1} (n+q-2h-1)^{2q-1|-1} \dots]$$

Diese Fragen können nach den bisherigen Bemerkungen mit

Hülfe der in den §§. 6 bis 10 angegebenen Methode und gefundenen Gleichungen leicht vermehrt werden, besonders wenn noch der Inbegriff mehrerer Summen in Betrachtung gezogen wird. Wir gehen jedoch zu weitem wichtigern Anwendungen über.

Diese ergeben sich insbesondere, wenn die Elemente, woraus die Summen erzeugt werden, unendlich viele werden und dabei in einer bestimmten Grenze eingeschlossen bleiben. Für diesen Fall wird die Gesamt-Zahl jedem einzelnen Elemente gegenüber unendlich groß. Hiemit werden aber auch die Summen unendlich viele und erheben sich bis zu der höchsten Grenze, welche durch das Product der Classenzahl und der Elementen-Grenze-Zahl angegeben wird. Werden nun die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Summen unter den genannten Bedingungen bestimmt, so folgert sich hieraus nothwendig, daß die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Fall verschwindend klein seyn muß, da es unendlich viele gibt und alle zusammen der Gewissheit $=1$ gleichkommen. Hiernach wird die Wahrscheinlichkeit für den einzelnen Fall durch das Differenzial in Beziehung auf das Verhältniß der Summe zu der Elementengrenze ausgedrückt werden.

Wenden wir nun diese Bemerkungen auf die in diesem §. gegebenen Gleichungen an, so ist zu berücksichtigen, daß in ihnen sofort die endlichen Größen den unendlichen gegenüber verschwinden, und die Fakultäten in Potenzen übergehen. Die Gleichung 1 geht sofort, wenn $\frac{n}{r} = s$ gesetzt wird, in folgende über

$$7) w = \frac{1}{1^{q-1|1}} \left(\sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} (s-x)^{q-1} \right) ds$$

die Gleichung 5, wenn $\frac{n}{h} = s$ gesetzt wird, in folgende

$$8) w = 2^q \left(\sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x|1}}{1^{x|1}} \sum_{y+z=x} \frac{(y+z)^{y+z|1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(s-[y+z])^{2q-x|1}}{1^{2q-x-1|1}} \right) ds$$

Hierin kann x die Werthe 0, 1, 2, 3, ... q durchlaufen. Für jeden einzelnen Werth von x ist aber $y+z=x$ nach dem zweiten

Σ zu setzen, während $y+z$ die verschiedenen Summen zur zweiten Classe bilden, wenn sie getrennt erscheinen.

Aus der Gleichung 6 wird unter denselben Bedingungen

$$9) w = \left(\sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{(2q)^{x-1}}{1^{x|1}} \frac{(s-x)^{2q-1|1}}{1^{2q-1|1}} \right) ds$$

Mit diesen Gleichungen werden wir noch anderweitige Fragen, als die bisherigen, zu beantworten im Stande seyn.

Setzen wir den Fall, irgend eine Ursache kann innerhalb bestimmter Grenzen in allen möglichen Richtungen, oder für irgend einen Zweck in allen gedenkbaren Abstufungen wirken, so werden die Richtungen oder Zwecke u. s. w, selbst wieder bestimmten Beschränkungen, oder Grenzen unterliegen können, und es kann die Frage entstehen: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die durch eine solche Ursache hervorgebrachte Wirkung innerhalb bestimmte Grenzen eingeschlossen seyn werde?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird nöthig seyn, die Größe aller Wahrscheinlichkeiten zwischen bestimmten Grenzen anzugeben. Dieß geschieht durch Aufsuchung der Integrale für die vorstehenden Differenziale innerhalb bestimmter Grenzen. Werden diese Grenzen durch m und n vorgestellt, so sind die Gleichungen in Beziehung auf m und n zu integrieren. Geschieht dieß, so wird die gesuchte Wahrscheinlichkeit aus der Gleichung 7

$$\begin{aligned} 10) w &= \frac{1}{1^{q-1|1}} \int_m^n \left[\left(\sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x|1}} (s-x)^{q-1} \right) ds \right] \\ &= \frac{1}{1^{q|1}} \left[\left(\frac{n}{r} \right)^q - q \left(\frac{n}{r} - 1 \right)^q + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \left(\frac{n}{r} - 2 \right)^q - \dots \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{m}{r} \right)^q + q \left(\frac{m}{r} - 1 \right)^q - \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \left(\frac{m}{r} - 2 \right)^q + \dots \right] \end{aligned}$$

Aus der Gleichung 8 ergibt sich sofort

$$\begin{aligned} 11) w &= \int_m^n \left[2^q \left(\sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{q^{x-1}}{1^{x|1}} \sum_{y+z=x} \frac{(y+z)^{y+z-1}}{1^{y|1} 1^{z|1}} \frac{(s-[y+z])^{2q-x-1}}{1^{2q-x-1|1}} \right) ds \right] \\ &= \frac{2^q}{1^{2q|1}} \left[\left(\frac{n}{h} \right)^{2q} - q \left(\left(\frac{n}{h} - 1 \right)^{2q} + 2q \left(\frac{n}{h} - 1 \right)^{2q-1} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{q^{2|1}}{1^{2|1}} \left(\left(\frac{n}{h} - 2 \right)^{2q} + 2.2q \left(\frac{n}{h} - 2 \right)^{2q-1} + (2q)^{2|1} \left(\frac{n}{h} - 2 \right)^{2q-2} \right) \right. \\ &\quad \left. \vdots \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & - \frac{2^1}{1^{2q+1}} \left(\left(\frac{m}{h} \right)^{2q} - q \left(\left(\frac{m}{h} - 1 \right)^{2q} + 2q \left(\frac{m}{h} - 1 \right)^{2q-1} \right) \right. \\
 & + \frac{q^{2|-1}}{1^{2q+1}} \left(\left(\frac{m}{h} - 2 \right)^{2q} + 2 \cdot 2q \left(\frac{m}{h} - 2 \right)^{2q-1} + (2q)^{2|-1} \left(\frac{m}{h} - 2 \right)^{2q-2} \right) \\
 & \quad \vdots \\
 & \quad \quad \quad \vdots \\
 & \quad \quad \quad \left. \vdots \right)
 \end{aligned}$$

Aus 9 wird

$$\begin{aligned}
 12) \quad w &= \int_m^n \left(\left(\sum_{x=0}^{x=q} (-)^x \frac{(2q)^{x|-1}}{1^{x+1}} \frac{(s-x)}{1^{2q-1|-1}} \right) ds \right) \\
 &= \frac{1}{1^{2q+1}} \left(\left(\frac{n}{h} \right)^{2q} - \left(\frac{m}{h} \right)^{2q} - \frac{2q}{1} \left(\left(\frac{n}{h} - 1 \right)^{2q} - \left(\frac{m}{h} - 1 \right)^{2q} \right) \right. \\
 & \quad + \frac{(2q)^{2|-1}}{1^{2q+1}} \left(\left(\frac{n}{h} - 2 \right)^{2q} - \left(\frac{m}{h} - 2 \right)^{2q} \right) \\
 & \quad - \frac{(2q)^{3|-1}}{1^{2q+1}} \left(\left(\frac{n}{h} - 3 \right)^{2q} - \left(\frac{m}{h} - 3 \right)^{2q} \right) \\
 & \quad \quad \quad \vdots \\
 & \quad \quad \quad \left. \vdots \right)
 \end{aligned}$$

Die Ebenen der Planetenbahnen gehen bekanntlich sämmtlich durch den Mittelpunkt der Sonne und sind mehr, oder weniger gegen die Ebene der Erdbahn geneigt. Geht man bei diesen Neigungen von der Ebene der Erdbahn als Basis aus, so betrug die Summe der Neigungen der übrigen zehn Planetenbahnen nach Littrow's theori-scher Astronomie Pg. 248 am Anfange des Jahres 1801 81°,93

Mercur	7,02°	Ceres	10,62°
Venus	3,06°	Pallas	34,58°
Mars	1,86°	Jupiter	1,31°
Vesta	7,14°	Saturn	2,49°
Juno	13,07°	Uranus	0,78°

Nimmt man nun an, dafs bei Einführung der Planeten in ihre Bahnen der Zufall geherrscht habe, und dafs jede Vertheilung an der Himmelsphäre gleich möglich gewesen wäre, so ist eine unend-liche Menge von Richtungen durch den Mittelpunkt der Sonne ge-denkbar.

Beschränkt man sich hiebei auf den Umstand, dafs die Bewegung der Planeten in ihren Bahnen um die Sonne nach einer und derselben

Richtung vor sich geht, so war ihre Vertheilung in einen rechten Winkel eingeschlossen, und die eilf Planeten konnten unter sich alle mögliche Neigungen von 0° bis 100° einnehmen. Legt man nun jeder möglichen Neigung einer Planetenbahn den ihr zugehörigen Zahlenwerth bei, so kann jede die unendlich vielen Zahlenwerthe von 0° bis 100° durchlaufen. Die Summen aller möglichen Lagen der Planetenbahnen sind dann zwischen den Grenzen 0° bis 1100° eingeschlossen. Nach der obigen Angabe beträgt aber ihre Summe $81,93^\circ$ sechszigtheiliger Eintheilung, oder $91,03^\circ$ hunderttheiliger. Nun kann man unter der Voraussetzung einer gleich möglichen Vertheilung fragen: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Neigungen der eilf Planetenbahnen die Summe von $91,03^\circ$ nicht überschritten haben würden?

Diese Frage beantwortet sich leicht, wenn in der Gleichung 10 $n=91,03$, $r=100$, $m=0$ und $q=11$ gesetzt wird. Es entsteht für die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$13) w = \frac{1}{1^{11,1}} \frac{(91,03)^{11}}{100^{11}} = 0,00000000890992$$

Hiernach ist 99999999 gegen 1 zu wetten, daß die Neigungen der Planetenbahnen unter der genannten Voraussetzung die Summe von $91,03^\circ$ nicht überschritten hätten, oder innerhalb der Summengrenze zwischen 0 und $91,03^\circ$ eingeschlossen geblieben wären.

Laplace behandelte diese Aufgabe in seiner *Théorie analytique des probabilités* 3^{me} Ed. Par. 1820 Pg. 257 und findet die Wahrscheinlichkeit größer, nämlich:

$$\frac{1}{1^{10,1}} (0,914187)^{10} = 0,00000011235$$

Er hat nur zehn Planeten in Betrachtung gezogen, was natürlich zu einem andern Resultat führen mußte. Eine nach den Vega'schen Logarithmentafeln ausgeführte Rechnung gab mir den Werth der Wahrscheinlichkeit 0,0000001123786 . . . also in der fünften Zahl von dem von Laplace mitgetheilten verschieden.

In der oben angegebenen Wahrscheinlichkeit ist möglich, daß die Neigungen der einzelnen Planetenbahnen sich mehr, als die der Pallas von der Erdbahn entfernt, und die Grenze $34^{\circ},58$ überschritten hätten. Sie hätten sich auf 60° , 70° und darüber entfernen können, wenn nur der Inbegriff aller Summen die Grenze $81,93^{\circ}$ nicht überschritten worden wäre.

Geht man daher auf einen andern Gesichtspunkt über und fragt: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Bahnen sämtlicher Planeten eine Dimension von 10° nicht überschritten hätten, also sämtlich in eine Grenze von zehn Graden eingeschlossen geblieben wären, unter der Voraussetzung, daß alle Lagen unter ihren Bahnen gleich möglich waren, so ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, wenn die Anzahl der Fälle, worin die elf Planetenbahnen in einer Ausdehnung von 10° eingeschlossen bleiben, durch die Zahl aller möglichen Fälle gemessen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist

$$14) w = \frac{10^{11}}{100^{11}} = \frac{1}{1000000000000}$$

und es ist hiernach 999999999999 gegen 1 zu wetten, daß dieß nicht eingetreten wäre, wenn alle Neigungen der Planetenbahnen gleich möglich gewesen wären.

Die Betrachtung der bisherigen Fälle ging von der Voraussetzung aus, daß die Bewegung sämtlicher Planeten nur nach einer Richtung im Himmelsraume hin möglich war. Nimmt man aber an, daß die Bewegung der Planeten in ihrer Bahn auch im entgegengesetzten Sinne möglich war, so dehnen sich die Grenzen, zwischen welchen die Lagen der Planetenbahnen im Himmelsraume fallen konnten, von 0° bis 200° aus. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit, daß die Summe der Neigungen der elf Planetenbahnen die Grenze $91,03^{\circ}$ nicht überschritten haben würden, wenn alle Lagen und die Richtungen im entgegengesetzten Sinne gleich möglich gewesen wären, während sie doch in ihrer Bewegung nur einerlei Richtung befolgen.

$$15) w = \frac{(91,03)^{11}}{1^{11} \cdot (200)^{11}} = 0,00000000000435054 \dots$$

und es läßt sich **9999999999** gegen 1 wetten, daß die Neigungen der Planetenbahnen nicht in die bezeichnete Summengrenze eingeschlossen geblieben wären. Geht man von der nämlichen Voraussetzung aus und fragt: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Neigungen der Planetenbahnen auf eine Zone von 10° eingeschränkt geblieben wären, so ergibt sich

$$16) w = \frac{10^{11}}{(200)^{11}} = 0,00000000000004882812 \dots$$

Diese Resultate machen den Schluss sehr wahrscheinlich, daß bei Einführung der Planeten in ihre Bahnen und in ihre Richtung auf denselben der Zufall keineswegs vorgeherrscht habe. Diese Ansicht gewinnt noch mehr Bestand, wenn wir die Neigungen der vier Asteroiden wegen ihrer größern Divergenz aus dem Calcul ausschließen. Die Zahl der Elemente wird zwar geringer und damit sollte nothwendig ein Steigen der Wahrscheinlichkeit verbunden seyn. Dennoch aber zeigt sich der Gleichung 13 gegenüber ein Fallen der Wahrscheinlichkeit, welche für das Eintreffen des Ereignisses spricht und dadurch das zufällige Eingreifen einer Ursache stärker verneint. Der Werth der Wahrscheinlichkeit ist bei einer Summe von $18,35^\circ$ für die Neigungen von 7 Planeten

$$17) w = \frac{(18,35)^7}{1^{11}(100)^7} = 0,000000001390027 \dots$$

Wir gehen nun von folgender Voraussetzung aus: Eine Ursache habe bei Einführung der Planeten in ihre Bahnen so gewirkt, daß sie dieselben von der Lage einer bestimmten Ebene weggetrieben habe, und zwar in steigender arithmetischer Progression, also um so stärker wirkend, je weiter die Lagen der Ebenen von der ursprünglichen sich entfernt hätten. Die Grenze der Wirkung sey die Größe eines rechten Winkels. Soll unter dieser Voraussetzung die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, daß die bestehende Anordnung satt gefunden haben würde, so ist die Gleichung 11 zu benützen, und $n=91,03^\circ$, $q=1$, $m=0$ zu setzen. Wir erhalten

$$18) w = \frac{2^{11} (91,03)^{22}}{1^{22} (100)^{22}} = \frac{0,2306796}{10^{18}}$$

Der Werth dieser Wahrscheinlichkeit ist so klein, daß die Annahme, als sey die bestehende Anordnung aus dieser Voraussetzung hervorgegangen, an die Unmöglichkeit grenzt, und daß sich die Annahme, als habe das Gegentheil hievon statt gehabt, zu solcher Gewissheit steigert, daß sie jede historische Wahrheit, die wir kaum zu beanstanden wagen, an Sicherheit unendlich überragt. Würden wir die Möglichkeit der doppelsinnigen Richtung auf den Bahnen in den Calcul aufnehmen, so würde sich die gefundene Wahrscheinlichkeit um das $2^{11}=2048$ fache verkleinern, und dadurch die Richtigkeit der Annahme des Gegentheils um so mehr steigern.

§. 13.

Mittelst der bisher aufgefundenen Gleichungen lassen sich auch Anwendungen auf Sicherheit gemachter Beobachtungen, Möglichkeit und Gröfse der dabei vorkommenden Fehler machen.

Der Zweck jeder Beobachtung ist ein fehlerfreies Resultat zu erhalten, oder wenn dieß nicht möglich ist, der Wahrheit so nahe, als möglich zu kommen, und jeden dabei möglichen Fehler nach Kräften zu vermeiden. Da aber dieß keine leichte Sache ist, die Fehler sich bei aller Sorgfalt und Mühe dennoch einschleichen, aller Aufmerksamkeit und Geduld spotten, und man daher nie ganz verlässigt seyn kann, ein vollkommen richtiges und genaues Resultat aufgefunden zu haben, so wird es unter diesen Verhältnissen erwünscht seyn, ein Mittel kennen zu lernen, wodurch man im Stande ist, wenigstens die Grenzen anzugeben, innerhalb welcher der zu befürchtende Fehler unter bestimmten Bedingungen eingeschlossen seyn wird. In diesem Falle werden uns die bisher gefundenen Gleichungen gute Dienste leisten.

Man kann wohl mit Recht annehmen, daß sich die Geschicklichkeit eines Beobachters mit der Uebung und öftern Wiederholung

steigern, daß mit der größern Geschicklichkeit auch die Möglichkeit zu irren sich mindern und die Gewandtheit vermehren werde, Fehler zu vermeiden. Nimmt man nun an, daß jemand seine Aufmerksamkeit der Beobachtung eines Ereignisses, oder irgend einer Messung und dergl. zuwende, wobei es sich um die Ermittlung des richtigen Resultates handelt, so können Fehler von verschiedener Bedeutung vorkommen. Ein Fehler wird um so größer seyn, je weiter er von dem richtigen Resultate entfernt ist, er wird um so kleiner seyn, je näher er demselben liegt, er wird 0 seyn, wenn die Beobachtung mit dem richtigen Resultat zusammenfällt. Die Beobachtung wird schlecht seyn, wenn sie ein Resultat trifft, das weit von dem richtigen Resultate liegt, und um so schlechter, je weiter es von demselben absteht. Setzen wir nun weiter voraus, die Geschicklichkeit des Beobachters stehe mit der Möglichkeit, das richtige Resultat zu treffen, in einfachem arithmetischem Verhältnisse, und die Wahrscheinlichkeit, ein besseres Resultat zu erhalten sey größer, als die, ein weniger gutes zu erhalten, die Wahrscheinlichkeit das richtige Resultat zu treffen, sey am größten, diejenige sich bis zur äussersten Fehlergrenze zu verirren am kleinsten, wie dieß mit den Bemühungen eines gewandten und sorgfältigen Beobachters im Einklang steht, so entsteht die Frage: Wie groß ist unter dieser Voraussetzung die Wahrscheinlichkeit, daß der eine solche Beobachtung begleitende Fehler sich nicht über die Grenze $+n$ und $-n$ ausdehnen werde, wenn die bei derselben mögliche Fehler-Grenze durch $+h$ und $-h$ bezeichnet wird?

Die Frage geht von der Bedingung aus, daß der vorkommende Fehler positiv, oder negativ seyn oder im entgegengesetzten Sinne bei der Beobachtung statt finden könne, und findet ihre Beantwortung mit einigen Modifikationen durch die Gleichung 12 §. 12, Pg. 69. Diese Gleichung stellt den Inbegriff der Wahrscheinlichkeiten für die Summen dar, welche zwischen den Grenzen m und n liegen. Alle Summen, die möglich sind, liegen zwischen der Grenze 0 und $2qh$. Die Grenzen für die Werthe, woraus die Summen erzeugt werden

können, liegen zwischen 0 und $2h$. Der Werth der mittleren Summe ist für die dort gegebene Form qh . In unserm Falle sind die Grenzen der Werthe, welche die Summen erzeugen, $-h$ und $+h$, die Grenzen der Summen $-qh$ und $+qh$, der Werth der mittleren Summe 0, die Grenzen, innerhalb welcher die Fehler eingeschlossen bleiben sollen, $-n$ und $+n$. Hiernach sind die Werthe der erzeugenden Elemente in der dortigen Gleichung um h zu erniedrigen, für das Mittelglied qh , für die Fehlergrenzen $qh - n$ und $qh + n$ zu setzen, und diese für m und n in der dortigen Gleichung einzuführen. Es ergibt sich für die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$1) w = \frac{1}{4^{2q}} \left[\left(\frac{qh+n}{h} \right)^{2q} - \left(\frac{qh-n}{h} \right)^{2q} - \frac{2q}{1} \left(\left(\frac{qh+n}{h} - 1 \right)^{2q} - \left(\frac{qh-n}{h} - 1 \right)^{2q} \right) \right. \\ \left. + \frac{(2q)^{2q-1}}{4^{2q-1}} \left(\left(\frac{qh+n}{h} - 2 \right)^{2q} - \left(\frac{qh-n}{h} - 2 \right)^{2q} \right) \right. \\ \left. - \frac{(2q)^{2q-1}}{4^{2q-1}} \left(\left(\frac{qh+n}{h} - 3 \right)^{2q} - \left(\frac{qh-n}{h} - 3 \right)^{2q} \right) \right. \\ \left. \vdots \right]$$

q zeigt in dieser Gleichung die Zahl der Beobachtungen an, h die äusserste Fehlergrenze, welche bei einem Beobachter möglich ist. Der Werth von $qh + n$ und $qh - n$ muss nach den besondern Bedingungen der Aufgabe vorerst ermittelt werden.

Wir benützen diese Gleichung zur nähern Untersuchung einiger besondern Fälle.

Jemand beobachtet mit einem Messinstrumente. Die äusserste Fehlergrenze, bis zu welcher er irren kann, gehe bis zu zehn Stufen rechts oder links vom richtigen Resultate. Die Geschicklichkeit des Beobachters ist so, dass er nach der Aufgabe den grössten positiven oder negativen Fehler nur einmal unter 100 Fällen begehen, die weniger bedeutenden öfter, und endlich das richtige Resultat am häufigsten zu erhalten suchen, und auch wirklich treffen wird. Er macht 1, 2, 3, 4, 5 Beobachtungen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der begangene Fehler nicht über 4 Stufen vom

richtigen Resultate entfernen, und also innerhalb dieser Grenzen eingeschlossen seyn wird?

Wird eine Beobachtung gemacht, so ist $q=1$ und $qh+n=14$, $qh-n=6$ zu setzen und der Werth der Wahrscheinlichkeit ist

$$w = \frac{1}{2} [1,4^2 - 0,6^2 - 2 \cdot 0,4^2] = 0,64$$

Unter 10 Fällen kann man bei einmaliger Beobachtung nahezu siebenmal ein Resultat erhalten, wobei kein gröfserer Fehler, als der oben bezeichnete vorkommt.

Werden zwei Beobachtungen gemacht, so ist $q=2$, $qh+n=28$, $qh-n=12$ in 1 zu setzen, und es entsteht

$$w = \frac{1}{1^{4|1}} (2,8^4 - 1,2^4 - 4[1,8^4 - 0,2^4] + \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} 0,8^4) = \frac{198656}{240000} = 0,827733 \dots$$

Werden drei Beobachtungen gemacht, so ist $qh+n=42$ und $qh-n=18$ und $q=3$ zu setzen. Die Wahrscheinlichkeit wird seyn

$$w = \frac{1}{1^{6|1}} (4,2^6 - 1,8^6 - 6(3,2^6 - 0,8^6) + 15 \cdot 2,2^6 \dots) = \frac{65512128}{72000000} = 0,90989066 \dots$$

Werden vier Beobachtungen gemacht, so ist $qh+n=56$, $qh-n=24$ und $q=4$ zu setzen. Es ergibt sich für die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$w = \frac{1}{1^{8|1}} (5,6^8 - 2,4^8 - 8(4,6^8 - 1,4^8) \dots) = \frac{3835458326528}{4032000000000} = 0,95125456301 \dots$$

Werden fünf Beobachtungen gemacht, so ist $qh+n=70$, $qh-n=30$ und $q=5$ zu setzen. Die fragliche Wahrscheinlichkeit wird

$$w = \frac{1}{1^{10|1}} (7^{10} - 3^{10} - 10(6^{10} - 2^{10}) + 45(5^{10} - 1) \dots) = \frac{3531092}{3628800} = 0,973074 \dots$$

Man erkennt hieraus, dafs die Wahrscheinlichkeit ein richtiges Resultat zu erhalten, sich mit der Zahl der Beobachtungen steigert, und man kann 99 gegen 2 wetten, dafs bei fünf sorgfältigen Beobachtungen der Fehler 4 Stufen nicht übersteigen werde, wenn die äusserste Fehlergrenze bis auf 10 Stufen sich erheben kann. Diese Fehlergrenze ist ziemlich grofs. Nimmt man die äusserste Fehlergrenze halb so klein, so wird sich auch die Grenze für den zu befürchtenden Fehler auf die Hälfte zurückführen, und man kann dann

mit denselben Graden der Wahrscheinlichkeit erwarten, daß der Fehler, den das Resultat in sich trägt, sich höchstens bis zu zwei Stufen erheben, oder überhaupt $\frac{2}{5}$ der äußersten Fehlergrenze nicht übersteigen werde.

Diese Schlüsse finden allenthalben bei Messungen ihre Anwendungen. Beobachtet jemand unter diesen Voraussetzungen mit einem Repetitionskreise oder einem Theodoliten und erstreckt sich die äußerste Fehlergrenze bis auf fünf Theile des niedersten Maasses, so ergeben sich die obigen Wahrscheinlichkeiten, daß nach mehrmaligen Messungen der Fehler die genannten Grenzen nicht überschreiten werde, und es folgert sich leicht hieraus, daß bei Messungen, die nicht eine besondere Genauigkeit erfordern, eine viermalige Wiederholung genügt, wie denn diese Zahl auch in gewöhnlichen Fällen nicht überschritten wird.

Vergleicht man die Wahrscheinlichkeiten, welche den verschiedenen Anzahlen der Beobachtungen zugehören, so erkennt man leicht, daß sie im Wachsen begriffen sind. Sie werden sich bei fernern Wiederholungen noch weiter steigern lassen, und der Schluss ergibt sich leicht, daß durch beliebig fortgesetzte Wiederholung der Messungen die Sicherheit des Resultates immer mehr befestigt wird.

Die Wahrscheinlichkeiten, daß eine gegebene Fehlergrenze nicht werde überschritten werden, wachsen nämlich mit der Anzahl der angestellten Beobachtungen, und werden um so größer, je größer die Zahl der Wiederholungsfälle ist, wenn auch die angenommene Fehlergrenze ganz enge angenommen seyn sollte. Hiedurch zeigt sich, warum durch Messungen, die 20 oder 30 mal wiederholt werden, die Sicherheit des Resultates so hoch gesteigert, und ausser allem Zweifel gestellt werden kann, und warum insbesondere, die so häufig und sorgfältig wiederholten Beobachtungen der Astronomie so großes Zutrauen verdienen.

Bisher wurde der Werth der Wahrscheinlichkeiten miteinander verglichen, während die Wiederholungsfälle sich steigerten, die

Fehlergrenze aber unverändert und in ein bestimmtes Verhältniß zu der Zahl aller möglichen Fälle eingeschlossen blieb. Nun können auch diese Werthe untereinander verglichen werden, wenn die Wiederholungsfälle sich steigern, und die Fehlergrenze enger gezogen wird.

Oben Pg. 76 hat sich die Wahrscheinlichkeit, daß der Fehler die 4^{te} Stufe bei einer Beobachtung nicht überschreiten werde, auf 0,64 bestimmt. Ziehen wir die Fehlergrenze um $\frac{1}{2}$ Stufe enger, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß der zu begehende Fehler bei zwei Beobachtungen die Stufe 3,5 nicht überschreiten werde.

$$w = \frac{1}{4^{4,1}} (2,7^4 - 1,3^4 - 4(1,7^4 - 0,3^4) + 6 \cdot 0,7^4) = 0,764691 \dots$$

Werden drei Beobachtungen gemacht, und wird die Fehlergrenze wieder enger und auf $3\frac{1}{3}$ Stufe gezogen, so ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, daß der zu begehende Fehler diese Stufe nicht überschreiten werde.

$$w = \frac{1}{4^{6,1}} (4^6 - 2^6 - 6(3^6 - 1^6) + 15 \cdot 2^6 - 20 \cdot 1^6) = 0,838888 \dots$$

Bei vier Beobachtungen und der Fehlergrenze 3,25 ist die Wahrscheinlichkeit, daß der zu begehende Fehler diese Grenze nicht überschreiten werde.

$$w = \frac{1}{4^{8,1}} (5,3^8 - 2,7^8 - 8(4,3^8 - 1,7^8) + \dots) = 0,887507494 \dots$$

Bei fünf Beobachtungen und der Fehlergrenze 3 ist die Wahrscheinlichkeit, daß der zu begehende Fehler diese Grenze nicht überschreiten werde.

$$w = \frac{1}{4^{10,1}} (6,5^{10} - 3,5^{10} - 10(5,5^{10} - 2,5^{10}) + \dots) = 0,8990949 \dots$$

Diese Bemerkungen kann man noch weiter fortsetzen, und auch auf andere hierhergehörige Fälle ausdehnen. Sie weisen auf folgenden nicht unwichtigen Satz.

Wird unter der Voraussetzung, daß mit der Uebung die Geschicklichkeit des Beobachters, nach den oben genannten Bedingungen das richtige Resultat zu treffen, wächst, die Zahl der Beobachtungen

gesteigert, so wird nicht nur die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit des Resultates erhöht, sondern es läßt sich zugleich die Fehlergrenze in engere Schranken ziehen, ohne daß das Wachsen der Wahrscheinlichkeit, welche das Einschließen eines Fehlers in die engere Grenze bestimmt, gefährdet wird.

Das Einschränken der Fehlergrenzen wird bei gröfserer Zahl der Beobachtungen langsamer vorschreiten, als bei kleinerer Zahl.

Endlich ergibt sich mittelst der Gleichung 12 §. 12, Pg. 69 die Möglichkeit, Fehler, welche innerhalb bestimmter Grenzen liegen, miteinander zu vergleichen.

Die Voraussetzungen, einen Fehler bei dem Beobachten zu begehen, seyen dieselben, wie bisher. Wie grofs ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Fehler gemacht werde, der zwischen der äussersten Fehlergrenze und der ersten Stufe des kleinsten Maafses auf einer bestimmten Seite des richtigen Resultates liege, wenn fünf Beobachtungen gemacht werden?

Die Wahrscheinlichkeit bestimmt sich, wenn $m=0$, $n=5$, $h=10$ gesetzt wird. Sie ist

$$w_1 = \frac{1}{1^{10}} 0,5^{10} = \frac{9765625}{36288000000000000} = 0,0000000002691144 \dots$$

Die Wahrscheinlichkeit, daß unter diesen Voraussetzungen der Fehler zwischen der äussersten Fehlergrenze und der zweiten Stufe liegen werde, ist

$$w_2 = \frac{1}{1^{10}} = \frac{1}{3628800} = 0,0000002755732 \dots$$

Setzt man diese Schlüsse fort, so ergeben sich die Wahrscheinlichkeiten, daß die begangenen Fehler zwischen der äussersten Fehlergrenze und der dritten Stufe, zwischen der äussersten Fehlergrenze und der vierten Stufe liegen werden u. s. w. Werden diese Wahrscheinlichkeiten der Reihe nach durch w_3 , w_4 , w_5 , . . . w_9 , w_{10} bezeichnet, so gewinnen wir folgende Zusammenstellung

$$w_3 = \frac{1}{1^{10|1}} [1,5^{10} - 10 \cdot 0,5^{10}] = 0,00001588824 \dots$$

$$w_4 = \frac{1}{1^{10|1}} [2^{10} - 10 \cdot 1^{10}] = 0,0002794312 \dots$$

$$w_5 = \frac{1}{1^{10|1}} [2,5^{10} - 10 \cdot 1,5^{10} + 45 \cdot 0,5^{10}] = 0,002469173 \dots$$

$$w_6 = \frac{1}{1^{10|1}} [3^{10} - 10 \cdot 2^{10} + 45 \cdot 1^{10}] = 0,01346295 \dots$$

$$w_7 = 0,05045251 \dots$$

$$w_8 = 0,1388769 \dots$$

$$w_9 = 0,29452 \dots$$

$$w_{10} = 0,5$$

Man sieht, dass diese Wahrscheinlichkeiten wachsen, je gröfser die Zahl der Stufen wird, zwischen welche die Fehler fallen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler zwischen einer der äussersten Fehlergrenze und dem richtigen Resultate liegen werde, wird 0,5 seyn, wie diess aus der Natur der Sache hervorgeht.

Benützt man nun die Gleichung 12 §. 12, Pg. 69 in dem angegebenen Sinne weiter, so leiten sich nun auch leicht die Wahrscheinlichkeiten ab, dass der Fehler gerade zwischen der äussersten Fehlergrenze und der ersten Stufe, zwischen der ersten Stufe und zweiten, zwischen der zweiten und dritten u. s. f. liegen werde. Sie sind, wenn sie der Reihe nach durch $w_1, w_2, w_3, w_4, \dots, w_9, w_{10}$ bezeichnet werden

$$w_1 = 0,0000000002697348 \dots$$

$$w_2 = 0,000000275304 \dots$$

$$w_3 = 0,0000156127 \dots$$

$$w_4 = 0,000263543 \dots$$

$$w_5 = 0,00218974 \dots$$

$$w_6 = 0,0109937 \dots$$

$$w_7 = 0,0369895 \dots$$

$$w_8 = 0,088424 \dots$$

$$w_9 = 0,15565 \dots$$

$$w_{10} = 0,30547 \dots$$

Vergleicht man die hier gefundenen Resultate, so zeigt sich, dass unter den oben aufgestellten Voraussetzungen die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, um so gröfser wird, je näher er dem

richtigen Resultate liegt, oder je kleiner, und unwichtiger er ist, daß dagegen die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Fehler zu begehen, um so kleiner wird, je weiter er von dem richtigen Resultat absteht, oder je größer und bedeutender er wird.

Da die vorstehenden Schlüsse, auf jeden andern hierher gehörigen Fall angewendet, ähnliche Resultate hervorrufen, so ergibt sich leicht, daß der eben ausgesprochene Satz allgemein gilt.

§. 14.

Die Gleichung 12 §. 12, Pg. 69 läßt auch noch eine Anwendung auf die Güte und Sicherheit eines durch Beobachtung gewonnenen Resultates und auf die Bedeutung des dabei zu fürchtenden Fehlers zu.

Sie läßt sich nämlich als ein Flächenraum betrachten, der von einem Theil der Abscissenaxe, von zwei Ordinaten und einer Curve eingeschlossen ist, deren Länge durch die Endpunkte der zwischen liegenden Ordinaten bestimmt wird. Die Länge der Abscissenaxe ist $2qh$, die Abscissen können alle Werthe von 0 bis $2qh$ durchlaufen. Für jeden Werth ist eine Ordinate möglich. Sie ergibt sich, wenn die Gleichung 9 §. 12 benützt wird. Die Curve durchschneidet die Abscissen-Axe in zwei Punkten, wie sich durch Einführung der Werthe 0 und $2qh$ ergibt.

Die Gleichung 12 §. 12 gibt hiernach den Flächenraum zwischen den Ordinaten n und m , dem Stücke $n - m$ und der Curve in Beziehung auf die Einheit an. Um ein anderes Maafs für diese Fläche als die Einheit zu erhalten, ist nur nöthig die genannte Gleichung durch h^{2q} zu vervielfachen. Es entsteht

$$1) F_1 = \frac{1}{1^{2q+1}} \left(n^{2q} - m^{2q} - 2q \left((n-h)^{2q} - (m-h)^{2q} \right) \right. \\ \left. + \frac{(2q)^{2q-1}}{1^{2q+1}} \left((n-2h)^{2q} - (m-2h)^{2q} \right) \right. \\ \left. \vdots \right)$$

Der von der Curve und der Abscissenaxe eingeschlossene Flächenraum ist sofort

$$2) F_2 = \frac{1}{4^{2q+1}} \left((2qh)^{2q} - 2q ([2q-1]h)^{2q} + \frac{(2q)^{2q-1}}{4^{2q-1}} ([2q-1]h)^{2q} - \dots \right)$$

Die Ordinaten, welche für die Abscissen 0 bis $2qh$ möglich sind, fallen ihrer Bedeutung nach mit den Möglichkeiten zusammen ein bestimmtes Resultat zu erhalten, darunter ist nur eine, die Mittelordinate, welche ein fehlerfreies Resultat andeutet. Ihre Grösse wird aus der Gleichung 9 §. 12, oder durch Differenziren der Gleichung 1 hinsichtlich n und durch Einführen des Werthes qh erhalten. Sie ist

$$y = \frac{1}{4^{2q+1}} \left((qh)^{2q-1} - 2q ([q-1]h)^{2q-1} + \frac{(2q)^{2q-1}}{4^{2q-1}} ([q-2]h)^{2q-1} - \dots \right)$$

$$3) y = \frac{2q}{4^{2q+1}} \left((qh)^{2q-1} - 2q ([q-1]h)^{2q-1} + \frac{(2q)^{2q-1}}{4^{2q-1}} ([q-2]h)^{2q-1} - \dots \right)$$

Wäre bei der Beobachtung kein Fehler möglich, so müßte jede Ordinate mit der Mittelordinate gleiche Grösse haben. In jeder Richtung müßte das wahre Resultat gefunden werden und die Fläche würde für diesen Fall ein Rechteck bilden, dessen Flächenraum durch das Product der Mittelordinate und der Abscissenaxe ($2qh$) bestimmt und durch folgende Gleichung dargestellt wird

$$4) F_3 = \frac{2q \cdot 2qh}{4^{2q+1}} \left((qh)^{2q-1} - 2q ([q-1]h)^{2q-1} + \frac{(2q)^{2q-1}}{4^{2q-1}} ([q-2]h)^{2q-1} - \dots \right)$$

Der hier angegebene Flächenraum schließt die Fläche des richtigen Resultates und die der Fehler ein. Die Fläche, welche die Fehler in sich begreift, liegt zwischen der Tangente der Mittelordinate und der Curve.

Die Fläche des Rechteckes, welches zwischen dem Abscissenstücke $n - m$ und den zugehörigen Ordinaten n und m liegt, wenn letztere bis zur Tangente verlängert werden, ergibt sich durch Vielfachen der Gleichung 3 mit $n - m$ und es ist

$$5) F_4 = \frac{2q(n-m)}{4^{2q+1}} \left((qh)^{2q-1} - 2q ([q-1]h)^{2q-1} + \frac{(2q)^{2q-1}}{4^{2q-1}} ([q-2]h)^{2q-1} - \dots \right)$$

In diesem Flächenraum ist derjenige des richtigen Resultates und des damit verbundenen Fehlers begriffen.

Bei den bisher gefundenen Darstellungen liegt der Abscissenursprung an dem einen Endpunkte der Axe. Legt man ihn in den

Mittelpunkt der Axe, wie bei der Gleichung 1 §. 13, Pg. 75 geschah, und führt Ordinaten ein, die gleichweit vom Mittelpunkte auf beiden Seiten abstehen, so ist $qh+n$ statt n und $qh-n$ statt m zu setzen. Für diesen Fall geht die Gleichung 1 in folgende über

$$6) F_1 = \frac{1}{1^{2q+1}} \left((qh+n)^{2q} - (qh-n)^{2q} - 2q \left(([q-1]h+n)^{2q} - ([q-1]h-n)^{2q} \right) \right. \\ \left. + \frac{(2q)^{2q-1}}{1^{2q+1}} \left(([q-2]h+n)^{2q} - ([q-2]h-n)^{2q} \right) \right. \\ \left. \vdots \right)$$

Die Gleichung 5 in folgende

$$7) F_4 = \frac{4qn}{1^{2q+1}} \left((qh)^{2q-1} - 2q ([q-1]h)^{2q-1} + \frac{(2q)^{2q-1}}{1^{2q+1}} ([q-2]h)^{2q-1} - \dots \right)$$

Der Werth von n muß, wie oben, nach den besondern Bedingungen der Aufgabe ermittelt werden.

Diese Gleichungen setzen uns in Stand die Stärke eines unter gegebenen Voraussetzungen begangenen Fehlers zu bestimmen. Seine Stärke oder Bedeutung wird nämlich durch das Verhältniß der Fläche, welche die GröÙe des begangenen Fehlers zu der ganzen Fehlerfläche ausdrückt, dargestellt werden können, und es ist

$$8) E = \frac{F_4 - F_1}{F_3 - F_2}$$

Benützen wir diese Gleichung zu Ermittlung der Fehlerstärke für eine und dieselbe Zahl der Beobachtungen und bei verschiedenen Fehlergrenzen, so ergibt sich für den Fall als zwei Beobachtungen gemacht werden, und 4 Stufen als Fehlergrenze angenommen werden

$$E_0 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 16(20^3 - 4 \cdot 10^3) - 28^4 + 12^4 + 4(18^4 - 2^4) - 6 \cdot 8^4}{4 \cdot 40(20^3 - 4 \cdot 10^3) - 40^4 + 4 \cdot 30^4 - 6 \cdot 20^4 + 4 \cdot 10^4} = \frac{57344}{400000} = 0,14336$$

Werden bei derselben Anzahl der Beobachtungen die Fehlergrenzen auf $3\frac{1}{2}$, 3, 2 Stufen gesetzt, so ist der Reihe nach

$$E_1 = 0,101185, E_2 = 0,06696, E_3 = 0,02176$$

Die Wahrscheinlichkeiten, welche für das Eintreffen dieser Fälle sprechen, sind

$$w_0 = 0,827733 \dots w_1 = 0,764691 \dots w_2 = 0,6884 \dots w_3 = 0,497066 \dots$$

Werden drei Beobachtungen gemacht und wird die Bedeutung der Fehler für die Stufen 4, $3\frac{1}{3}$, 3, 2 bestimmt, so ergibt sich aus 8

$$E_1 = 0,184347 \dots, E_2 = 0,1158 \dots, E_3 = 0,0863969 \dots, E_4 = 0,0284864 \dots$$

Die Wahrscheinlichkeiten, gerade diese Resultate zu erhalten, sind $w_1 = 0,90989066 \dots, w_2 = 0,8388 \dots, w_3 = 0,7912867 \dots, w_4 = 0,59548$

Werden vier Beobachtungen gemacht, so ergibt sich die Bedeutung der Fehler für die Stufen $3\frac{1}{4}$ und 3

$$E_1 = 0,126592 \dots, E_2 = 0,1038427 \dots$$

und die Wahrscheinlichkeiten, welche für das Eintreffen dieser Fälle sprechen, sind

$$w_1 = 0,887705907 \dots, w_2 = 0,85609 \dots$$

Diese Zusammenstellung läßt sich weiter fortsetzen. Sie führt zu folgendem Satze:

Die Bedeutung eines Fehlers wird bei einer und derselben Zahl von Beobachtungen um so geringer, in je engere Grenzen der Fehler eingeschlossen wird. Die Wahrscheinlichkeit aber, den Fehler in engere Grenzen einzuschließen, wird ebenfalls geringer.

Vergleichen wir aber bei wachsender Zahl der Beobachtungen und Verengerung der Fehlergrenze die Bedeutung der Fehler und die Wahrscheinlichkeiten diese zu erhalten, so ergibt sich für zwei, drei und vier Wiederholungen bei den bezüglichen Fehlergrenzen 4, $3\frac{1}{3}$ und 3 die Bedeutung der dabei begangenen Fehler

$$E_1 = 0,14336, E_2 = 0,1158 \dots, E_3 = 0,103842 \dots$$

Die Wahrscheinlichkeiten diese Resultate zu erhalten sind

$$w_1 = 0,82773 \dots, w_2 = 0,8388 \dots, w_3 = 0,85609 \dots$$

Es zeigt sich, daß die Bedeutung der begangenen Fehler geringer wird, während die Wahrscheinlichkeiten, diese Fehler zu erhalten, steigen. Diese Vergleichung läßt sich noch weiter fortsetzen. Sie weist auf folgenden Satz:

Wird die Zahl der Beobachtungen gesteigert, so nimmt die Bedeutung der dabei möglichen Fehler ab. Dabei schließt sich die Fehlergrenze immer enger, und die Wahrscheinlichkeit ein fehlerfreieres Resultat zu erhalten, nimmt zu gleicher Zeit zu.

Wiederholte Beobachtungen führen daher zu immer fehlerfreieren Resultaten.

Aus der Gleichung 8 lassen sich noch weitere Folgerungen über Fehlergrenzen ziehen. Wir verfolgen sie aber nicht weiter.

Verstehen wir unter der Güte eines durch Beobachtung gewonnenen Resultates das Verhältniß, welches zwischen der Fläche, die von der oben angedeuteten Curve, zwei Ordinaten und dem zwischen ihnen liegenden Axen-Abschnitt eingeschlossen wird, und derjenigen statt findet, die von den verlängerten Ordinaten, der Tangente und demselben Abscissenstücke (also derjenigen Fläche, die entsteht, wenn kein Fehler möglich wäre) eingeschlossen wird, so erhalten wir zu ihrer Bestimmung

$$9) G = \frac{F_1}{F_4}$$

Die Bedeutung des Gegentheils ist

$$10) U = \frac{F_4 - F_1}{F_4}$$

Benützen wir auch diese Gleichungen, so lassen sich ähnliche Resultate, wie oben, gewinnen und darunter folgendes:

Bei einer und derselben Zahl der Beobachtungen ist die Güte des Resultates um so gröfser, je enger die Fehlergrenze gezogen wird. Die Wahrscheinlichkeit aber, die engere Fehlergrenze zu erhalten, wird dann kleiner, und man hat gröfsere Hoffnung, ein Resultat bei gröfserer Fehlergrenze, also ein weniger gutes zu erhalten, als ein fehlerfreieres.

Wir kehren endlich zu dem in §. 12 gegebenem Beispiele zurück. Dort wurde gezeigt, dafs die bestehende Anordnung der Planetenbahnen ganz unwahrscheinlich erscheinen würde, wenn jede beliebige Neigung der einzelnen Bahnen an der Himmelsphäre gleich möglich gewesen wäre, oder wenn eine Ursache bei der Einführung der Planeten in ihre Bahnen in irgend einer Richtung ablenkend gewirkt hätte. Wir wollen nun die bestehende Anordnung in der Neigung der Planetenbahnen unter der Voraussetzung betrachten, dafs eine Ursache bei Einführung der Planeten auf ihre Bahnen in einer be-

stimmten Richtung am stärksten und auf beiden Seiten von derselben in gleichem Maasse abnehmend so gewirkt habe, daß in einer Entfernung von 10° ihre Grenze zu setzen sey. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß unter dieser Annahme die Neigungen von 10 Planetenbahnen in die Grenze von 5° auf beiden Seiten der bezeichneten Richtung eingeschlossen worden wäre, oder daß die Breite des Thierkreises nicht 10° überschritten hätte?

Die fragliche Wahrscheinlichkeit ergibt sich, wenn $n = 150^\circ$, $m = 50^\circ$, $q = 10$, $h = 10^\circ$ in 12 §. 12, Pg. 69 gesetzt wird. Sie ist

$$w = \frac{1}{1^{20|1}} \left(15^{20} - 5^{20} - 20(14^{20} - 4^{20}) + \frac{20^{2|1}}{1^{2|1}} (13^{20} - 3^{20}) \dots \right) = 0,999949\dots$$

Die Zahl 10 ist der kürzern Rechnung wegen gewählt. Es ist klar, daß nach der Bemerkung des §. 12 die Wahrscheinlichkeit noch größern Werth erhalten würde, wenn 11 Planetenbahnen in den Calcul aufgenommen würden. Das Eintreffen des durch sie angezeigten Resultates ist aber sehr wahrscheinlich, denn der vorstehende Werth liegt der Einheit ziemlich nahe.

Vergleichen wir aber mit diesen Folgerungen die Neigungen der Planetenbahnen, so ergibt sich eine ziemliche Differenz, denn die Bahnen des Merkurs, der Vesta, Ceres, Juno und Pallas übersteigen diese Grenze und besonders letztere bedeutend. Diese Bemerkung nöthigt, obige Annahme von einer einwirkenden Ursache bei Einführung der Planeten in ihre Bahnen entweder gänzlich, oder sie wenigstens in der angegebenen Form zu verlassen, und dann, wegen der bedeutenden Divergenz in den Bahnen der eben genannten Planeten, verschieden wirkende Ursachen anzunehmen oder verschiedene Perioden bei Einführung der Planeten in ihre Bahnen anzunehmen. Gegen diese letztere Annahme dürfte vielleicht die große Harmonie, die in den Bahnen der Planeten und ihren Trabanten herrscht, und dann auch der Umstand sprechen, daß die Naturgesetze immer auf die einfachste Weise wirken, ihre Thätigkeit mag die Erzeugung der Welten, oder der Atome bezwecken. Die Annahme einer in bestimmter Richtung wirkenden Ursache ist daher auch bei Einführung

der Planeten in ihre Bahnen die einfachste Annahme. Diese Ursache kann aber in ihrer Wirkung durch zufällig eingreifende Umstände gestört worden seyn, etwa durch eine excentrische Lage des Schwerpunktes eines Planeten, welche eine Ablenkung von der ursprünglichen Richtung zur Folge haben mußte, oder durch ein Zerplatzen der Masse eines Planeten im Augenblicke der Einführung. Auf diese Weise dürften sich die Divergenzen in der Bahn des Merkurs und dann die der vier kleinern Planeten Vesta, Ceres, Juno und Pallas leicht erklären lassen. Hiemit stimmt auch die zerstreute Lage der Bahnen dieser Planeten, während die der sieben übrigen Planeten offenbar mit der oben angedeuteten Annahme übereinstimmt und einer sehr engen Zone angehört.

Selbst wenn man die Grenze, worin die Neigungen der Planetenbahnen wegen der Divergenz der Pallasbahn hätten eingeschlossen bleiben sollen, bis auf 40° ausdehnt, ergibt sich kein günstiges Resultat. Für diesen Fall erhebt sich die Summe der Neigungen dieser Planetenbahnen auf ungefähr 100° . Die Wahrscheinlichkeit nun, daß die Summe dieser Neigungen sich nicht über 100° erheben werde, ergibt sich, wenn in der Gleichung 12 §. 12 $n=100$, $h=40$ und $q=5$ gesetzt wird und ist

$$w = \frac{1}{4^{10} 12^{10}} [5^{10} - 10 \cdot 3^{10} + 45 \cdot 1^{10}] = 0,002469173 \dots$$

Ein Werth, der viel zu unbedeutend ist, um eine andere Annahme zu begründen, und daher auf die oben gemachten Schlüsse zurückweist.

Wir beschließen diese Abhandlung mit folgender Anwendung

Ein Collegium, das aus fünf Richtern besteht, hat mit Ja oder Nein über eine vorgelegte Frage zu entscheiden. Wir nehmen an, daß die Gründe, welche Für und Gegen sprechen, gleich, und daß sofort auch die Motive eines jeden einzelnen Richters sich für Ja oder Nein zu entscheiden, gleich groß sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß das Collegium mit Ja entscheiden werde?

Nach den Prämissen der Aufgabe ist kein bestimmter Werth den

Motiven untergelegt. Es sind daher alle gedenkbare Abstufungen für diese Werthe, zwischen 0 und 1 anzunehmen. Die Wahrscheinlichkeiten für jede einzelne Abstufung innerhalb dieser Grenzen sind sich gleich. Alle Werthe zwischen 0 und 1 bilden die erzeugenden Elemente. Es entstehen daher alle möglichen Summen von 0 bis 5 zur 5^{ten} Classe. Legt man nun jeder Summe einen bestimmten Werth in der Entscheidung der Frage über Ja und Nein bei, so wird die Summe 0 die einstimmige Entscheidung aller Richter für Nein, die Summe 5 die einstimmige Entscheidung für Ja bezeichnen. Zwischen diesen Grenzwerthen liegen alle gedenkbaren Abstufungen für diese Entscheidungen. Die Summen von $\frac{5}{2}$ und darüber werden daher die für die fragliche Wahrscheinlichkeit günstigen Fälle bezeichnen. Wird hiernach die Gleichung 10 §. 12, Pg. 68 benützt und in ihr $n=5$, $r=1$, $q=5$, $m=\frac{5}{2}$ gesetzt, so ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$11) w = \frac{1}{1^5} \left(5^5 - \left(\frac{5}{2}\right)^5 - 5 \left[4^5 - \left(\frac{3}{2}\right)^5 \right] + \dots \right) = \frac{1}{2}$$

Unter diesen Voraussetzungen ist die Wahrscheinlichkeit, daß mit Ja entschieden werden wird, eben so groß als die, daß mit Nein entschieden werden wird.

Die Bedingungen sind dieselben. Die Gründe Für und Gegen sind nicht gleich. Sie neigen sich auf die eine Seite (etwa für Ja) und zwar in steigendem arithmetischem Verhältnisse. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß für diese Seite entschieden werden wird?

Da die Gründe sich auf die eine Seite neigen, so werden sich auch die Motive der einzelnen Richter hiernach bestimmen. Die Wahrscheinlichkeiten, sich für die verschiedenen Grade der Abstufungen zwischen Nein und Ja zu entscheiden, werden nicht gleich seyn, sondern nach dem gegebenen Verhältnisse zunehmen. Liegen die Grenzen hiefür auch zwischen 0 und 1, so ergibt sich in Beziehung auf die vorhin gemachte Bemerkung die gesuchte Wahrscheinlichkeit, wenn $n=5$, $m=\frac{5}{2}$ in $q=5$, $h=1$ in 11 §. 12, Pg. 68 gesetzt wird. Es ist

$$12) w = \frac{2^5}{4^{10|1}} \left[5^{10} - 5 \cdot [4^{10} + 10 \cdot 4^9] + \dots \right] \\ - \frac{2^5}{4^{10|1}} \left[\left(\frac{5}{2}\right)^{10} - 5 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{10} + 10 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^9 \right] + \dots \right] = 0,935358 \dots$$

Der Werth dieser Wahrscheinlichkeit ist nicht unbedeutend, und es läßt sich ungefähr 15 gegen 1 wetten, dafs nach der oben angegebenen Voraussetzung die Entscheidung ausfallen werde.

Wenden wir die Bemerkungen zu 11 und 12 auf 1, 2, 3, 4, 6, . . . Personen an, die in einer Sache mit Ja oder Nein zu entscheiden haben, so werden die Wahrscheinlichkeiten, für Ja oder Nein zu entscheiden, immer einander gleich seyn, wenn die Gründe Für und Gegen einander gleich sind. Neigen sich aber die Gründe auf die eine Seite nach dem oben angenommenen Maafse, so haben die Wahrscheinlichkeiten, dafs für diese werde entschieden werden, folgende Werthe

$$w_1 = 0,75 \\ w_2 = 0,8333 \dots \\ w_3 = 0,88020833 \dots \\ w_4 = 0,9126984 \dots \\ w_5 = 0,935358 \dots \\ w_6 = 0,951677 \dots$$

u. s. w., wenn durch $w_1, w_2, w_3, w_4, \dots$ die Wahrscheinlichkeiten für die Entscheidung durch 1, 2, 3, 4, . . . Personen bezeichnet und nach der Gleichung 11 §. 12 bestimmt werden.

Die Werthe dieser Wahrscheinlichkeiten wachsen, wie sich aus dieser Zusammenstellung ergibt. Unter diesen Voraussetzungen wird ein Urtheil um so entschiedener ausfallen, je mehr Personen zu urtheilen haben. Es ist daher nicht gleichgültig, wie viele Personen in einer Sache zu entscheiden haben, und es kann nicht zweifelhaft seyn, ob das Interesse eines Betheiligten besser durch eine gröfsere oder durch eine kleinere Zahl von Richtern vertreten werde.

Kehren wir nun die erhaltenen Resultate um, so folgert sich leicht: Entscheidet ein Collegium mit unbedeutender Majorität, so werden die Gründe Für und Gegen gleich oder nahe gleich seyn; entscheidet

es mit bedeutender Majorität, oder gar mit Einstimmigkeit, so werden die Gründe Für die Gegen überwiegen.

Diese Schlüsse sind jedoch nur bei einem Collegium, das aus intelligenten und gewissenhaften Richtern besteht, zulässig. Es lassen sich noch weitere Anwendungen aus den hier aufgefundenen Gleichungen auf Entscheidungen machen, welche aus Collegien, oder Versammlungen hervorgehen, worin bestimmte Ansichten, Observanzen u. s. w. vorherrschen mögen, auf Entschlüsse einzelner Personen bei bestimmter Charakter-Richtung, auf die Erwählung concurrirender Candidaten bei verschiedenen Verdiensten zu irgend einem Amte und dergl. Doch überlassen wir dieß dem Leser.

Oettinger, Ludwig,

Die Versetzungen mit Wiederholungen zu bestimmten Summen aus einer oder mehreren beliebig beschränkten Elementen-Reihen nebst ihrer Anwendung auf Analysis und Wahrscheinlichkeits-Rechnung

Freiburg 1840

4 Diss. 3847,11

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10976186-7